



# Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Pró-reitoria de Ensino



## Atividades de Reforço em Cálculo

Módulo de

## Matemática Básica

2019/1

### Aula 01

Projeto  
**GAMA**  
Grupo de Apoio em  
Matemática

# Conjuntos Numéricos

## Números naturais

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\}$$

### Subconjunto notável

$$\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots\} \quad \text{Naturais positivos}$$

## Números inteiros

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

### Subconjuntos notáveis

$$\mathbb{Z}_- = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0\} \quad \text{Inteiros não- positivos}$$

$$\mathbb{Z}_+ = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad \text{Inteiros não- negativos}$$

$$\mathbb{Z}_*^- = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1\} \quad \text{Inteiros negativos}$$


$$\mathbb{Z}_*^+ = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad \text{Inteiros positivos}$$

$$\mathbb{Z}^* = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad \text{Inteiros não nulos}$$

# Conjuntos Numéricos

## Números racionais

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^* \right\}$$



Subconjuntos notáveis     $\mathbb{Q}_-$      $\mathbb{Q}_+$      $\mathbb{Q}_-^*$      $\mathbb{Q}_+^*$      $\mathbb{Q}^*$

## Números reais

$$\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}'$$


Irracionais ←  
Todos os números reais  
que não são racionais

## Subconjuntos notáveis

$\mathbb{R}_-$      $\mathbb{R}_+$      $\mathbb{R}_-^*$      $\mathbb{R}_+^*$      $\mathbb{R}^*$

# Conjuntos Numéricos

Representação dos conjuntos numéricos por diagramas



# Pertinência e inclusão

## Pertinência

Relaciona elemento e conjunto.

 $\in$ 

pertence

 $\notin$ 

não pertence

## Inclusão

Relaciona dois conjuntos.

 $\subset$ 

está contido

 $\not\subset$ 

não está contido

 $\supset$ 

contém

 $\not\supset$ 

não contém

O elemento  $x$  pertence ao conjunto  $A$

$$x \in A$$

$A$  é subconjunto  $B$

$$A \subset B$$

$A$  não é subconjunto  $B$

$$A \not\subset B$$

O elemento  $x$  não pertence ao conjunto  $A$

$$x \notin A$$

Todo elemento de  $A$  é  
também elemento de  $B$

$$B \supset A$$

Nem todos elementos  
de  $A$  são elemento de  $B$

**Exemplos:** Em cada caso, complete as lacunas com os símbolos  $\in$ ,  $\notin$ ,  $\subset$ ,  $\not\subset$ ,  $\supset$ ,  $\not\supset$  da forma mais conveniente em

$$2 \underline{\quad} \mathbb{N} \quad -5 \underline{\quad} \mathbb{Z} \quad -5 \underline{\quad} \mathbb{N} \quad 0 \underline{\quad} \mathbb{N}^*$$

$$\{1,2,3\} \underline{\quad} \{-1,0,1,2,3,4\} \quad \mathbb{N} \underline{\quad} \mathbb{Z} \quad \{-1,0,2\} \underline{\quad} \mathbb{N}$$

$$\mathbb{N} \underline{\quad} \mathbb{Z} \underline{\quad} \mathbb{Q} \underline{\quad} \mathbb{R} \quad \mathbb{Z} \underline{\quad} \mathbb{Q} \quad \mathbb{R} \underline{\quad} \mathbb{Q} \quad \mathbb{N} \underline{\quad} \mathbb{Z}^*$$

# Regra de sinais

## Somas e subtrações:

**Sinais iguais:** soma-se e conserva o sinal.

**Sinais diferentes:** subtrai-se e conserva-se o sinal do maior (em módulo).

### Exemplos:

$$8 + 3 = 11 \quad -7 - 3 = -10 \quad 5 - 3 = 2 \quad -10 + 4 = -6$$

## Multiplicações e divisões:

**Sinais iguais:** resulta em sinal positivo.

**Sinais diferentes:** resulta em sinal negativo.

### Exemplos:

$$(2) \cdot (3) = 6$$

$$(-5) \cdot (-3) = 15$$

$$(4) \cdot (-8) = -32$$

$$(-7) \cdot (2) = -14$$

# Intervalos reais

Intervalo aberto

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$



Intervalo fechado

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$



Intervalo semiaberto à esquerda

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$



Intervalo semiaberto à direita

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$



Intervalo ilimitado aberto à esquerda

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$$



Intervalo ilimitado fechado à esquerda

$$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$$



Intervalo ilimitado aberto à direita

$$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$$



Intervalo ilimitado fechado à direita

$$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$$



# Operações com Intervalos

**Exemplo:** Represente os seguintes intervalos na reta real.


$$(a) I_1 = (-2, 1) \quad (e) I_5 = (-1, +\infty) \quad (i) I_9 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 0\}$$

$$(b) I_2 = [-2, 2] \quad (f) I_6 = [1, +\infty) \quad (j) I_{10} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$$

$$(c) I_3 = (0, 3] \quad (g) I_7 = (-\infty, 3] \quad (k) I_{11} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$$

$$(d) I_4 = [-1, 3) \quad (h) I_8 = (-\infty, 2) \quad (l) I_{12} = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 2\}$$

**Solução:**




# Operações com Intervalos

**Exemplo:** Represente os seguintes intervalos na reta real.

- |                     |                           |   |
|---------------------|---------------------------|---|
| (a) $I_1 = (-2, 1)$ | (e) $I_5 = (-1, +\infty)$ | (i) $I_9 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x \leq 0\}$       |
| (b) $I_2 = [-2, 2]$ | (f) $I_6 = [1, +\infty)$  | (j) $I_{10} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 2\}$         |
| (c) $I_3 = (0, 3]$  | (g) $I_7 = (-\infty, 3]$  | (k) $I_{11} = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$         |
| (d) $I_4 = [-1, 3)$ | (h) $I_8 = (-\infty, 2)$  | (l) $I_{12} = \{x \in \mathbb{R} \mid -3 \leq x \leq 2\}$ |

**Solução:**



# Operações com Intervalos

## União

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Elementos que pertencem a pelo menos um dos conjuntos  $A$  ou  $B$

## Interseção

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Elementos que pertencem simultaneamente aos conjuntos  $A$  e  $B$

## Diferença

$$A - B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Elementos que pertencem ao conjuntos  $A$  e não pertencem ao conjunto  $B$


## Complementar

$$A' = \{x \mid x \notin A\}$$


Elementos que não pertencem ao conjunto  $A$

**Exemplo:** Sendo  $A = (-1, 2]$  e  $B = [0, 3]$ , determine  $A \cup B$  e  $A \cap B$ .

**Solução:**



$$A \cup B = (-1, 3]$$




$$A \cap B = [0, 2]$$

# Operações com Intervalos

**Exemplo:** Sendo  $I_1 = [0, 5)$  e  $I_2 = [2, +\infty)$ , determine:

- (a)  $I_1 \cup I_2$     (b)  $I_1 \cap I_2$     (c)  $I_1 - I_2$     (d)  $I_2 - I_1$     (e)  $I'_1$     (f)  $I'_2$

**Solução:**



# Decomposição em fatores primos

**Definição:** Um número natural  $p$  é chamado de **número primo** se  $p \geq 2$  e  $p$  é divisível apenas por 1 e por  $p$ .

**Exemplos:**

2 é primo    3 é primo    4 não é primo    5 é primo    6 não é primo

$$\begin{aligned} 4 &= 2 \cdot 2 \\ &\text{divisível por 2.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6 &= 2 \cdot 3 \\ &\text{divisível por 2 e por 3.} \end{aligned}$$

**Exemplos:** Em cada caso, decomponha o número dado como um produto de fatores primos.

(a) 12

(b) 125

(c) 232

**Solução:**

$$\begin{array}{r|l} (a) & 12 \mid 2 \\ & 6 \mid 2 \\ & 3 \mid 3 \\ & 1 \mid 2^2 \cdot 3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} &\text{Decomposição} \\ &\text{em fatores primos} \\ &12 = 2^2 \cdot 3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} (b) & 125 \mid 5 \\ & 25 \mid 5 \\ & 5 \mid 5 \\ & 1 \mid 5^3 \end{array}$$

$$\begin{aligned} &\text{Decomposição} \\ &\text{em fatores primos} \\ &125 = 5^3 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} (c) & 232 \mid 2 \\ & 116 \mid 2 \\ & 58 \mid 2 \\ & 29 \mid 29 \\ & 1 \mid 2^3 \cdot 29 \end{array}$$

$$\begin{aligned} &\text{Decomposição} \\ &\text{em fatores primos} \\ &232 = 2^3 \cdot 29 \end{aligned}$$

# Mínimo múltiplo comum

**Definição:** O **mínimo múltiplo comum** de dois inteiros positivos  $a$  e  $b$ , denotado por  $\text{mmc}(a, b)$  é o menor múltiplo comum de  $a$  e  $b$ .

**Exemplos:** Encontre

$$\text{mmc}(6, 15)$$

**Solução:** Note que os múltiplos positivos de 6 e de 15 são:

$$M(6) = \{6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, \dots\} \text{ e } M(15) = \{15, 30, 45, \dots\}$$

Portanto,

$$\text{mmc}(6, 15) = 30 \quad \begin{matrix} \text{Menor múltiplo} \\ \text{comum de 6 e 15} \end{matrix}$$

Na prática, encontra-se o  $\text{mmc}(a, b)$  utilizando-se o seguinte método prático, que utiliza a forma fatorada de  $a$  e  $b$ :

$$\begin{array}{r}
 6 - 15 \Big| 2 \\
 3 - 15 \Big| 3 \\
 1 - 5 \Big| 5 \\
 1 - 1 \Big| 2 \cdot 3 \cdot 5
 \end{array}$$

Portanto,  
 $\text{mmc}(6, 15) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$

# Mínimo múltiplo comum

Pode-se calcular o mínimo múltiplo comum entre três ou mais números utilizando-se um método parecido ao do exemplo anterior.

**Exemplos:** Encontre

$$mmc(10, 28, 35)$$

**Solução:** Utilizando a fatoração simultânea de 10, 28 e 35, tem-se:

$$\begin{array}{r}
 10 - 28 - 35 \\
 5 - 14 - 35 \\
 5 - 7 - 35 \\
 1 - 7 - 7 \\
 \hline
 1 - 1 - 1
 \end{array} \left| \begin{array}{l}
 2 \\
 2 \\
 5 \\
 7 \\
 \hline
 2^2 \cdot 5 \cdot 7
 \end{array} \right.$$

Portanto,

$$mmc(10, 28, 35) = 2^2 \cdot 5 \cdot 7 = 140$$

# Operações e propriedades das frações

## Igualdade de frações

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Leftrightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Duas frações são iguais sempre que a multiplicação cruzada resultar em números iguais.

## Simplificação

$$\frac{a \cdot c}{b \cdot c} = \frac{a}{b}$$

Fatores comuns ao numerador e denominador podem ser simplificados.

Exemplo:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} \quad \text{pois} \quad \underbrace{2 \cdot 6}_{12} = \underbrace{3 \cdot 4}_{12}$$

Exemplo:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{pois} \quad \underbrace{1 \cdot 2}_2 = \underbrace{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}}_2$$

Exemplo:

$$\frac{15}{12} = \frac{3 \cdot 5}{3 \cdot 4} = \frac{5}{4}$$

Exemplo:

$$\frac{25a}{5ab} = \frac{5 \cdot 5 \cdot a}{5 \cdot a \cdot b} = \frac{5}{b}$$

# Operações e propriedades das frações

Exemplo:

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{5} = \frac{\frac{10}{2} \cdot 1 + \frac{10}{5} \cdot 3}{10} = \frac{5 + 6}{10} = \frac{11}{10}.$$

$$\begin{array}{r}
 2 - 5 \quad 2 \\
 1 - 5 \quad | 5 \\
 1 - 1 \quad | 2 \cdot 5
 \end{array}$$

$$mmc(2, 5) = 2 \cdot 5 = 10$$

Soma/subtração

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{\frac{m}{b} \cdot a \pm \frac{m}{d} \cdot c}{m}$$

$m = m.m.c.(b, d)$  mínimo múltiplo comum entre  $b$  e  $d$ .

Exemplo:

$$\frac{3}{4} - \frac{7}{10} = \frac{\frac{20}{4} \cdot 3 - \frac{20}{10} \cdot 7}{20} = \frac{15 - 14}{20} = \frac{1}{20}.$$

$$\begin{array}{r}
 4 - 10 \quad 2 \\
 2 - 5 \quad | 2 \\
 1 - 1 \quad | 2 \cdot 2 \cdot 5
 \end{array}$$

$$mmc(4, 10) = 2 \cdot 2 \cdot 5 = 20$$

# Operações e propriedades das frações

## Multiplicação

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Multiplica-se o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo.

## Divisão

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Multiplica-se a primeira pelo inverso da segunda.

Exemplo:

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{8} = \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 8} = \frac{3}{40}.$$

Exemplo:

$$\frac{a+1}{2a} \cdot \frac{b}{a} = \frac{(a+1) \cdot b}{(2a) \cdot a} = \frac{ab + b}{2a^2}.$$

Exemplo:

$$\frac{5}{3} \div \frac{2}{7} = \frac{5}{3} \cdot \frac{7}{2} = \frac{5 \cdot 7}{3 \cdot 2} = \frac{35}{6}.$$

Exemplo:

$$\frac{a^2}{2b} \div \frac{a}{b} = \frac{a^2}{2b} \cdot \frac{b}{a} = \frac{a \cdot a \cdot b}{2 \cdot b \cdot a} = \frac{a}{2}.$$

# Operações com frações

**Exemplos:** Efetue as seguintes operações com frações

$$(a) \frac{1}{5} + \frac{2}{3}$$

$$(b) \frac{1}{8} - \frac{5}{4}$$

$$(c) \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2}$$

$$(d) \frac{4}{9} \div \frac{1}{2}$$

$$(e) \frac{3}{4} + \frac{1}{3} - \frac{4}{15}$$

Solução:

$$(a) \frac{1}{5} + \frac{2}{3} = \frac{\frac{15}{5} \cdot 1 + \frac{15}{3} \cdot 2}{15} = \frac{3 + 10}{15} = \frac{13}{15}.$$

$$\begin{array}{r|l} 5 & 3 \\ 5 & 1 \\ \hline 1 & 1 \end{array} \quad 3 \cdot 5$$

$$mmc(5, 3) = 3 \cdot 5 = 15$$

$$(b) \frac{1}{8} - \frac{5}{4} = \frac{\frac{8}{8} \cdot 1 - \frac{8}{4} \cdot 5}{8} = \frac{1 - 10}{8} = -\frac{9}{8}.$$

$$\begin{array}{r|l} 8 & 2 \\ 4 & 2 \\ 2 & 1 \\ \hline 1 & 1 \end{array} \quad 2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$(c) \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{2} = \frac{1 \cdot 5}{3 \cdot 2} = \frac{5}{6}. \quad (d) \frac{4}{9} \div \frac{1}{2} = \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{1} = \frac{4 \cdot 2}{9 \cdot 1} = \frac{8}{9}.$$

$$mmc(8, 4) = 2^3 = 8$$

$$(e) \frac{3}{4} + \frac{1}{3} - \frac{4}{15} = \frac{\frac{60}{4} \cdot 3 + \frac{60}{3} \cdot 1 - \frac{60}{15} \cdot 4}{60}$$

$$\begin{array}{r|l} 4 & 2 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{array} \quad 2 \cdot 3 \cdot 5$$

$$= \frac{15 \cdot 3 + 20 \cdot 1 - 4 \cdot 4}{60} = \frac{45 + 20 - 16}{60} = \frac{49}{60}.$$

$$mmc(4, 3, 15) = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$$



# Exercícios Propostos



# Exercícios

---

1) Represente graficamente os intervalos a seguir e verifique se os números

$$5; \quad \pi; \quad \sqrt{5}; \quad -0,2; \quad \frac{5}{2};$$

pertencem a cada intervalo:

(a)  $A = [-2,5)$   $\pi, \sqrt{5}, -0,2, \frac{5}{2}$     (b)  $B = (2,7)$   $5, \pi, \sqrt{5}, \frac{5}{2}$     (c)  $C = (6, +\infty)$  Nenhum

2) Sendo:  $A = [-2, 5]$ ,  $B = (2, 7)$  e  $C = (6, +\infty)$ . Determine:

(a) $A \cap C$	$\emptyset$	(c) $A - B$	$[-2, 2]$	(e) $(A \cup C) \cup B$	$[-2, , +\infty)$
(b) $A \cap B$	$(2,5]$	(d) $A \cup C$	$[-2,5] \cup (6, +\infty)$	(f) $(A - C) \cap B$	$(2,5]$

3) Sendo  $U = \mathbb{R}$  represente cada um dos intervalos indicados por compreensão e na reta real:

- (a) conjunto dos números maiores que  $-3$  e menores que  $1$ ;  $\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 1\}$
- (b) conjunto dos números menores ou iguais a  $-4$ ;  $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -4\}$
- (c) conjunto dos números maiores que  $-1$  ou menores que  $-3$ .  
 $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x > -1\}$

# Exercícios

---

4) Realize cada uma das operações envolvendo frações:

$$(a) \frac{3}{5} - \frac{2}{15} + \frac{1}{3} \quad \frac{4}{5}$$

$$(d) \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{3}\right)} \quad \frac{3}{4}$$

$$(b) -\frac{4}{7} \cdot \frac{2}{3} \quad -\frac{8}{21}$$

$$(e) \frac{4}{3} \div 2 \quad \frac{2}{3}$$

$$(c) \left(-\frac{3}{5}\right) \cdot \left(-\frac{2}{4}\right) \quad \frac{3}{10}$$

$$(f) \frac{-\frac{5}{3}}{\frac{15}{6}} \quad -\frac{2}{3}$$

5) Calcule:

$$(a) \frac{3}{2} - \frac{1}{5} \div \frac{3}{10} + 1 \quad \frac{11}{6}$$

$$(c) \frac{1}{3} + \left[ \frac{1}{3} \div \left( \frac{1}{4} + 1 \right) \right] \cdot \left( -\frac{1}{9} \right) \quad \frac{41}{135}$$


$$(b) 2 + 3 \cdot \left( -\frac{1}{2} \right) \quad \frac{1}{2}$$

# Exercícios

---

6) Represente graficamente na reta real os seguintes intervalos:

(a)  $\{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 3\}$



(b)  $(-\infty, 2]$



(c)  $[-3, \frac{1}{2}]$



(d)  $\{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x < 7\}$



(e)  $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$




(f)  $[0, 6)$




7) Escreva os intervalos representados graficamente:

(a)



$\{x \in \mathbb{R} \mid -4 \leq x \leq 2\}$  ou  $[-4, 2]$

(b)




$\{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$  ou  $(1, +\infty)$

(c)



$\{x \in \mathbb{R} \mid -3 < x < 3\}$  ou  $(-3, 3)$

(d)



$\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x \leq 2\}$  ou  $(0, 2]$

(e)



$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 1\}$  ou  $(-\infty, 1]$

# Exercícios

---

8) Dados os conjuntos a seguir, determine o que se pede.

(a)  $A = [2, 4]$  e  $B = [3, 6]$ :

$$A \cap B \quad \{x \in \mathbb{R} | 3 \leq x \leq 4\} \text{ ou } [3, 4]$$

$$A \cup B \quad \{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x \leq 6\} \text{ ou } [2, 6]$$

$$A - B \quad \{x \in \mathbb{R} | 2 \leq x < 3\} \text{ ou } [2, 3)$$

$$B - A \quad \{x \in \mathbb{R} | 4 < x \leq 6\} \text{ ou } (4, 6]$$

(b)  $A = \{x \in \mathbb{R} | x < 4\}$  e  $B = \{x \in \mathbb{R} | x < 1\}$ :  $A \cap B, A \cup B$ .

$$A \cap B \quad \{x \in \mathbb{R} | x < 1\} \text{ ou } (-\infty, 1)$$

$$A \cup B \quad \{x \in \mathbb{R} | x < 4\} \text{ ou } (-\infty, 4)$$

9) Dados os intervalos  $A = [-1, 4]$ ,  $B = [1, 5]$ ,  $C = [2, 4]$  e  $D = [1, 3]$ , verifique se 1 pertence ao conjunto  $(A \cap B) - (C - D)$ .

$$\{x \in \mathbb{R} | 1 \leq x \leq 3\} \text{ ou } [1, 3], \text{ portanto } 1 \in (A \cap B) - (C - D).$$

# Exercícios

---

10) Realize as seguinte operações envolvendo frações:

(a)  $\frac{25}{3} + \frac{5}{2} \div 2$        $\frac{115}{12}$

(b)  $\left(-\frac{3}{4}\right) \div \left(-\frac{5}{2}\right) + \left(\frac{27}{16}\right)$        $\frac{159}{80}$

(c)  $-1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{7}{8}$        $-\frac{5}{12}$

(d)  $\frac{12}{5} - \frac{24}{15}$        $\frac{4}{5}$

(e)  $\frac{2}{100} + \frac{98}{10}$        $\frac{491}{50}$

(f)  $\frac{27}{8} \div \frac{5}{16}$        $\frac{54}{5}$

(g)  $-2 \cdot \frac{23}{8} - \frac{1}{2}$        $-\frac{25}{4}$

(h)  $2 \cdot \frac{1}{8} + \frac{2}{7} - \frac{81}{9}$        $\frac{267}{28}$

# Monitorias!!

**Não esqueça de procurar os monitores do GAMA para melhor esclarecer suas dúvidas!!**

Os horários e locais de monitorias podem se encontrados na página do Projeto:

<http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>

O GAMA possui monitorias de:

- Pré-cálculo e Matemática Elementar (e disciplinas equivalentes)
- ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica (e disciplinas equivalentes)
  - Cálculo 1, Cálculo 1A e Cálculo I (e disciplinas equivalentes)

Certificado de 20 horas para quem procurar a monitoria do GAMA por pelo menos 15 vezes dentro do mesmo semestre letivo.



# Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Pró-reitoria de Ensino



## Atividades de Reforço em Cálculo

Módulo de

## Matemática Básica


2019/1

### Aula 02

Projeto  
**GAMA**  
Grupo de Apoio em  
Matemática

# Potências em $\mathbb{R}$

Dados  $a \in \mathbb{R}^*$  e  $n \in \mathbb{N}$ , definimos a **potência enésima** como:



$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$a^0 = 1$$

**Exemplo:** Calcule as seguintes potências

(a)  $2^3$

(b)  $5^{-2}$

(c)  $3^0$

**Solução:** Utilizando a definição de potência, tem-se:

$$(a) 2^3 = \underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2}_{3 \text{ fatores}} = 8$$

$$(b) 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{\underbrace{5 \cdot 5}_{2 \text{ fatores}}} = \frac{1}{25}$$

$$(c) 3^0 = 1$$

# Propriedades das potências

Produto de potências de mesma base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Exemplo:

$$2^3 \cdot 2^5 = 2^{3+5} = 2^8$$

Exemplo:

$$3^{2a} \cdot 3^5 = 3^{2a+5}$$

Quociente de potências de mesma base

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Exemplo:

$$\frac{3^5}{3^3} = 3^{5-3} = 3^2$$

Exemplo:

$$\frac{a^{5+b}}{a^c} = a^{5+b-c}$$

Potência de potência

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Exemplo:

$$(5^3)^4 = 5^{3 \cdot 4} = 5^{12}$$

Exemplo:

$$(a^2)^{2b} = a^{2 \cdot 2b} = a^{4b}$$

Fração com expoente negativo

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$$

Exemplo:

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-2} = \left(\frac{5}{3}\right)^2$$

Exemplo:

$$\left(\frac{1}{b}\right)^{-3} = b^3$$

# Propriedades das potências

Produto de potências de mesmo expoente

$$a^m \cdot b^m = (a \cdot b)^m$$

Exemplo:

$$2^5 \cdot 3^5 = (2 \cdot 3)^5 = 6^5$$

Exemplo:

$$4 \cdot a^2 = (2 \cdot a)^2$$

Quociente de potências de mesmo expoente

$$\frac{a^m}{b^m} = \left(\frac{a}{b}\right)^m$$

Exemplo:

$$\frac{2^7}{5^7} = \left(\frac{2}{5}\right)^7$$

Exemplo:

$$\frac{b^3}{27} = \left(\frac{b}{3}\right)^3$$

Potência de base negativa e expoente par

$$(-a)^n = a^n$$

Exemplo:

$$(-2)^6 = 2^6 = 64$$

Exemplo:

$$(-2x)^2 = (2x)^2 = 4 \cdot x^2$$

Potência de base negativa e expoente ímpar

$$(-a)^n = -a^n$$

Exemplo:

$$(-2)^5 = -2^5 = -32$$

Exemplo:

$$\left(-\frac{1}{2a}\right)^3 = -\frac{1}{8a^3}$$

# Potências em $\mathbb{R}$

**Exemplo:** Calcule as seguintes potências

$$(a) (-3)^4 \quad (b) (-2)^5 \quad (c) \left(\frac{1}{5}\right)^3 \quad (d) \left(\frac{5}{2}\right)^0 \quad (e) \left(\frac{2}{7}\right)^{-2} \quad (f) (2^4)^3$$

**Solução:** Utilizando as propriedades de potência, tem-se:

$$(a) (-3)^4 = 3^4 = 81$$

$$(d) \left(\frac{5}{2}\right)^0 = 1$$

$$(b) (-2)^5 = -2^5 = -32$$

$$(e) \left(\frac{2}{7}\right)^{-2} = \left(\frac{7}{2}\right)^2 = \frac{7^2}{2^2} = \frac{49}{4}$$

$$(c) \left(\frac{1}{5}\right)^3 = \frac{1^3}{5^3} = \frac{1}{125}$$

$$(f) (2^4)^3 = 2^{12} = 4096$$

# Potências de Base 10

Com o uso do sistema numérico decimal, as potências de base 10 são particularmente importantes! Note que:

Potência 2

$$10^2 = 100$$

2 zeros

Potência -1

$$10^{-1} = 0,1$$

1 zero

Potência 3

$$10^3 = 1.000$$

3 zeros

Potência -2

$$10^{-2} = 0,01$$

2 zeros

Potência 4

$$10^4 = 10.000$$

4 zeros

Potência -3

$$10^{-3} = 0,001$$

3 zeros

Potência 5

$$10^5 = 100.000$$

5 zeros

Potência -4

$$10^{-4} = 0,0001$$

4 zeros

No caso geral:

**Expoente positivo**

Potência  $n$

$$10^n = 100 \dots 0$$

$n$  zeros

**Expoente negativo**

Potência  $-n$

$$10^{-n} = 0,0 \dots 01$$

$n$  zeros

# Potências de Base 10

No geral, quando multiplicamos um número decimal por uma potência  $10^n$ , onde  $n$  é um número inteiro, podemos dizer que,

“a vírgula anda  $n$  casas para a esquerda ou  $n$  casas para a direita” de acordo com o sinal do expoente  $n$ .

- ✓ Se  $n$  é positivo, a vírgula se desloca  $n$  unidades para a direita;
- ✓ Se  $n$  é negativo, a vírgula se desloca  $|n|$  unidades para a esquerda;

**Exemplo:** Efetue os seguintes produtos:

$$(a) (12,5) \cdot 10^4$$

$$(b) (12,5) \cdot 10^{-4}$$

**Solução:**

$$(a) (12,5) \cdot 10^4 = (12,5\underset{\substack{\text{“A vírgula se desloca 4 casas} \\ \text{para a direita”}}}{\overbrace{0000}}) \cdot \underbrace{10.000}_{\substack{4 \text{ zeros}}} = 125.000.$$

$$(b) (12,5) \cdot 10^{-4} = (\dots 0000012,5) \cdot \underbrace{0,0001}_{\substack{4 \text{ zeros}}} = 0,00125.$$

“A vírgula se desloca 4 casas para a esquerda”

# Unidades de medida

Prefixos das principais unidades de medida

Potências	Prefixo	Símbolo	metro (m)	grama (g)	litro (l)
$10^{12}$	<i>Tera</i>	<i>T</i>	<i>Tm</i>	<i>Tg</i>	<i>Tl</i>
$10^9$	<i>Giga</i>	<i>G</i>	<i>Gm</i>	<i>Gg</i>	<i>Gl</i>
$10^6$	<i>Mega</i>	<i>M</i>	<i>Mm</i>	<i>Mg</i>	<i>Ml</i>
$10^3$	<i>Kilo</i>	<i>k</i>	<i>km</i>	<i>kg</i>	<i>kl</i>
$10^2$	<i>Hecto</i>	<i>h</i>	<i>hm</i>	<i>hg</i>	<i>hl</i>
10	<i>Deca</i>	<i>da</i>	<i>dam</i>	<i>dag</i>	<i>dal</i>
$10^0$			<i>m</i>	<i>g</i>	<i>l</i>
$10^{-1}$	<i>Deci</i>	<i>d</i>	<i>dm</i>	<i>dg</i>	<i>dl</i>
$10^{-2}$	<i>Centi</i>	<i>c</i>	<i>cm</i>	<i>cg</i>	<i>cl</i>
$10^{-3}$	<i>Mili</i>	<i>m</i>	<i>mm</i>	<i>mg</i>	<i>ml</i>
$10^{-6}$	<i>Micro</i>	$\mu$	$\mu m$	$\mu g$	$\mu l$
$10^{-9}$	<i>Nano</i>	<i>n</i>	<i>nm</i>	<i>ng</i>	<i>nl</i>
$10^{-12}$	<i>Pico</i>	$\rho$	$\rho m$	$\rho g$	$\rho l$

## Unidades de medida



**Comprimento:** a unidade padrão é o metro.


Quilômetro	Hectômetro	Decâmetro	Metro	Decímetro	Centímetro	Milímetro
$km$	$hm$	$dam$	$m$	$dm$	$cm$	$mm$
$10^3 m$	$10^2 m$	$10^1 m$	$10^0 m$	$10^{-1} m$	$10^{-2} m$	$10^{-3} m$
1.000m	100m	10m	1m	0,1m	0,01m	0,001m


 A horizontal red bracket spans the first four columns (km, hm, dam, m) and another spans the last three columns (dm, cm, mm). Arrows point from the left bracket to the right bracket, indicating the range of the base unit m.

**Múltiplos**      **Submúltiplos**

## Conversões

Da direita para a esquerda, divide-se por 10 em cada passo





# Conversões de unidades de medida


## Exemplo: Converta:

(a) 5,2 hectômetros para centímetros

(b) 130 milímetros para metros

## Solução:

(a)



## Hectômetros      Centímetros

$$5,2 \quad \longleftrightarrow \quad (5,2) \cdot 10^4$$

$$5,2 \quad \longleftrightarrow \quad (5,2) \cdot 10.000$$

$$5,2 \quad \longleftrightarrow \quad 52.000$$

Resposta: 5,2 hectômetros equivalem a 52.000 centímetros

# Conversões de unidades de medida


**Exemplo:** Converta:

(a) 5,2 hectômetros para centímetros

(b) 130 milímetros para metros

**Solução:**

(b)



Milímetros

130

130

130

Metros

$$130 \cdot 10^{-3}$$


$$130 \cdot 0,001$$

$$0,13$$


Resposta: 130 milímetros equivalem a 0,13 metros.

# Conversões de unidades de área e volume

## Conversão de área



## Conversão de volume





# Conversões de unidades de medida


## Exemplo: Converta:

(a)  $1500m^2$  para  $km^2$

(b)  $230dam^3$  para  $mm^3$

## Solução:

(a)



Metros quadrados      Quilômetros quadrados

$$1500 \quad \longleftrightarrow \quad 1500 \cdot 10^{-6}$$

$$1500 \quad \longleftrightarrow \quad 1500 \cdot 0,000001$$

$$1500 \quad \longleftrightarrow \quad 0,0015$$

Resposta: 1500 metros quadrados equivalem a 0,0015 quilômetros quadrados.


# Conversões de unidades de medida

**Exemplo:** Converta:

(a)  $1500m^2$  para  $km^2$

(b)  $230dam^3$  para  $mm^3$

**Solução:**



Resposta: 230 decâmetros cúbicos equivalem a 230.000.000.000 milímetros cúbicos.



# Exercícios Propostos



# Exercícios

---

1) Calcule as seguintes potências:

(a)  $(-2)^3$  -8      (c)  $-2^2$  -4      (f)  $(-2)^{-2}$  \frac{1}{4}      (h)  $3^{2^3}$  6561

(b)  $(-2)^2$  4      (d)  $2^{-2}$  \frac{1}{4}      (g)  $-3^{-3}$  -\frac{1}{27}      (i)  $(3^2)^3$  729

2) Calcule as seguintes potências:

(a)  $\left(\frac{2}{3}\right)^3$  \frac{8}{27}      (c)  $\left(-\frac{3}{4}\right)^2$  \frac{9}{16}      (e)  $\left(\frac{3}{2}\right)^{-1}$  \frac{2}{3}      (m)  $\left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}$  -\frac{27}{8}

(b)  $\left(-\frac{3}{4}\right)^3$  -\frac{27}{64}      (d)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$  \frac{9}{4}      (f)  $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3}$  64      (n)  $\left(-\frac{1}{3}\right)^{-2}$  9

3) Efetue os seguintes produtos:

(a)  $25 \cdot 10^5$  2500000      (e)  $3 \cdot 10^{-2}$  0,03

(b)  $(3,2) \cdot 10^4$  32000      (f)  $452 \cdot 10^{-5}$  0,00452

(c)  $(0,041) \cdot 10^2$  4,1      (g)  $(7,02) \cdot 10^{-3}$  0,00702

(d)  $(0,0243) \cdot 10^7$  243000      (h)  $224,5 \cdot 10^{-1}$  22,45

# Exercícios

---


4) Efetue as seguintes conversões:

- (a) 512 hectômetros para metros; **51.200**
- (b) 1255 decímetros para decâmetros; **12,55**
- (c) 1,2 quilômetros para centímetros; **120.000**
- (d) 0,230 decâmetros para decímetros; **23**
- (f)  $(1,7) \cdot 10^5$  milímetros para metros; **170**
- (g) 1200 metros quadrados para hectômetros quadrados; **0,12**
- (h) 1,25 decâmetros quadrados para metros quadrados; **125**
- (i) 3,42 metros cúbicos para decímetros cúbicos; **3.420**

# Exercícios

5) O metro cúbico, no Sistema Internacional de Unidade (SI), é a unidade fundamental para o cálculo do volume/capacidade. Sabendo que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, determine a capacidade, em litros, dos seguintes reservatórios:


(a)



Utilizar  $\pi \cong 3,14$


$$\text{Volume} \cong 1.727 \text{ litros}$$

(b)



$$\text{Volume} \cong 4.770 \text{ litros}$$

(c)



Utilizar  $\pi \cong 3,14$

$$\text{Volume} \cong 3.260,11 \text{ litros}$$

# Exercícios

---

6) Calcule as seguintes potências:

(a)  $3^5 \cdot 3^{-3}$

**9**

(b)  $(-5)^{2^3}$

**390625**

(c)  $(-4)^{2+5}$

**-16384**

(d)  $(-\frac{1}{3})^4$

**$\frac{1}{81}$**

(e)  $((-5)^2)^3$

**15625**

(f)  $(-5^2)^3$

**-15625**

(g)  $\left(\left(-\frac{1}{5}\right)^3\right)^{2-3}$

**-125**

(h)  $\left(\frac{2^3}{5}\right)^3$

**$\frac{512}{125}$**

(i)  $((-6)^3)^5 \cdot (-216)^{-7+2}$

**1**

(j)  $\left(\frac{5^3}{5^6}\right)$

**$\frac{1}{125}$**

# Exercícios

---

7) Calcule os seguintes produtos:

(a)  $3,75 \cdot 10^3$       **3750**

(b)  $49 \cdot 10^3 \cdot 0,1 \cdot 10^{-1}$       **490**

(c)  $0,005 \cdot 10^2$       **0,5**

(d)  $10007,06 \cdot 10^{-3}$       **10,00706**

(e)  $0,1005 \cdot 10^4$       **1005**

(f)  $65345,7 \cdot 10^{-5}$       **0,653457**

(g)  $0,120005 \cdot 10^1$       **1,20005**

(h)  $0,007 \cdot 10^{-2}$       **0,00007**

(i)  $2,504 \cdot 10^7$       **25040000**

(j)  $679 \cdot 10^{-1}$       **67,9**

8) Efetue as conversões de unidades como solicitado em cada letra:

(a)  $25 \cdot 10^{-3} hm \rightarrow m$       **2,5m**

(b)  $0,0000012 Tm \rightarrow m$       **1200000m**

(c)  $2005 cm \rightarrow km$       **1200\mu m**

(d)  $2 dam \rightarrow cm$       **2000cm**

(e)  $37 \cdot 10^3 mm \rightarrow dm$       **370dm**

(f)  $1 \cdot 10^9 pm \rightarrow \mu m$       **1200\mu m**

(g)  $342 \mu m^2 \rightarrow nm^2$

**$342 \cdot 10^6 \mu m^2$**

(h)  $100 km^3 \rightarrow m^3$

**$1 \cdot 10^8 m^3$**

(i)  $49 \cdot 10^6 Mm \rightarrow Gm$

**$49 \cdot 10^{-9} Gm$**

(j)  $999,8 hm \rightarrow dam$

**$9998dam$**

# Exercícios

---

9) Sabendo que 1L (um litro) equivale a  $1dm^3$ , quantos litros possui um reservatório d'água de  $50m^3$ ? Foram consumidos  $25000cm^3$  de água do reservatório. Quantos litros restaram?

**50000 litros, 49975 litros.**

# Monitorias!!

**Não esqueça de procurar os monitores do GAMA para melhor esclarecer suas dúvidas!!**

Os horários e locais de monitorias podem se encontrados na página do Projeto:

<http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>

O GAMA possui monitorias de:

- Pré-cálculo e Matemática Elementar (e disciplinas equivalentes)
- ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica (e disciplinas equivalentes)
  - Cálculo 1, Cálculo 1A e Cálculo I (e disciplinas equivalentes)

Certificado de 20 horas para quem procurar a monitoria do GAMA por pelo menos 15 vezes dentro do mesmo semestre letivo.



# Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Pró-reitoria de Ensino



## Atividades de Reforço em Cálculo

Módulo de

## Matemática Básica

2019/1

### Aula 03

Projeto  
**GAMA**  
Grupo de Apoio em  
Matemática

# Raízes em $\mathbb{R}$

Dados  $a \in \mathbb{R}$  e  $n \in \mathbb{N}$  tal que  $n \geq 2$ , definimos a **raiz enésima** como:

$$\sqrt[n]{b} = a \text{ se, e somente se, } a^n = b.$$

Índice  
Radicando

# Propriedades das Raízes

## Raiz como expoente fracionário

$$\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$$

Exemplo:

$$\sqrt{6} = 6^{\frac{1}{2}}$$

Exemplo:

$$\sqrt[3]{5^2} = 5^{\frac{2}{3}}$$

## Potência de raiz

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

Exemplo:

$$(\sqrt{x})^6 = \sqrt{x^6}$$

Exemplo:

$$(\sqrt[5]{3})^2 = \sqrt[5]{9}$$

## Produto de raízes de mesmo índice

$$\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$$

Exemplo:

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{10}$$

Exemplo:

$$\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{b} = \sqrt[4]{2b}$$

## Raiz de raiz

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Exemplo:

$$\sqrt[3]{\sqrt[4]{2}} = \sqrt[12]{2}$$

Exemplo:

$$\sqrt[5]{\sqrt{x}} = \sqrt[10]{x}$$

## Quociente de raízes de mesmo índice

$$\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

Exemplo:

$$\frac{\sqrt[4]{6}}{\sqrt[4]{5}} = \sqrt[4]{\frac{6}{5}}$$

Exemplo:

$$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{y}} = \sqrt{\frac{x}{y}}$$

# Raízes em $\mathbb{R}$

**Exemplo:** Calcule:

$$(a) \sqrt{1024} \quad (b) \sqrt[5]{32} \quad (c) (-8)^{\frac{1}{3}} \quad (d) 16^{\frac{3}{2}} \quad (e) \left(\frac{1}{81}\right)^{-\frac{1}{4}}$$

**Solução:** Utilizando a definição de raiz e suas propriedades, tem-se:

$$(a) \sqrt{1024} = \sqrt{2^{10}} = 2^{\frac{10}{2}} = 2^5 = 32$$

$$(b) \sqrt[5]{32} = \sqrt[5]{2^5} = 2$$

$$(c) (-8)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$$

$$(d) 16^{\frac{3}{2}} = \sqrt[2]{16^3} = \sqrt{(2^4)^3} = \sqrt{2^{12}} = 2^{\frac{12}{2}} = 2^6 = 64$$

$$(e) \left(\frac{1}{81}\right)^{-\frac{1}{4}} = (81)^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$$

# Raízes em $\mathbb{R}$

**Exemplo:** Simplifique ao máximo:

$$(a) \sqrt{24} \quad (b) \sqrt[3]{32} \quad (c) \sqrt[4]{512}$$

**Solução:** Utilizando a definição de raiz e suas propriedades, tem-se:

$$(a) \sqrt{24} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3} = 2 \cdot \sqrt{2 \cdot 3} = 2\sqrt{6}$$

$$(b) \sqrt[3]{32} = \sqrt[3]{2^3 \cdot 2^2} = \sqrt[3]{2^3} \cdot \sqrt[3]{2^2} = 2\sqrt[3]{4}$$

$$(c) \sqrt[4]{512} = \sqrt[4]{2^9} = \sqrt[4]{2^4 \cdot 2^4 \cdot 2} = \sqrt[4]{2^4} \cdot \sqrt[4]{2^4} \cdot \sqrt[4]{2} = 2 \cdot 2 \cdot \sqrt[4]{2} = 4\sqrt[4]{2}$$

# Racionalização

Racionalizar uma fração significa multiplicar e dividir a fração por um **fator racionalizante** de modo a simplificar as raízes do denominador.

Os casos mais comuns de racionalização são os seguintes:

**Caso 1:** o denominador é uma raiz quadrada.

Neste caso, o fator racionalizante é a própria raiz quadrada que aparece no denominador.

Exemplo	Fator	Forma racionalizada
$\frac{1}{\sqrt{a}}$	$\sqrt{a}$	$\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a^2}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$
$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{2}{\sqrt{6}}$	$\sqrt{6}$	$\frac{2}{\sqrt{6}} \cdot \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{\sqrt{6^2}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$

# Racionalização

**Caso 2:** o denominador é uma raiz de índice  $n$ .

Neste caso, se no denominador há a raiz  $\sqrt[n]{a^m}$ , o fator racionalizante será  $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ .

Exemplo	Fator	Forma racionalizada
$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$	$\sqrt[n]{a^{n-m}}$	$\frac{1}{\sqrt[n]{a^m}} \cdot \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^{n-m}}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{\sqrt[n]{a^n}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{a}$
$\frac{1}{\sqrt[5]{7^2}}$	$\sqrt[5]{7^3}$	$\frac{1}{\sqrt[5]{7^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{7^3}}{\sqrt[5]{7^3}} = \frac{\sqrt[5]{7^3}}{\sqrt[5]{7^5}} = \frac{\sqrt[5]{7^3}}{7} = \frac{\sqrt[5]{343}}{7}$
$-\frac{3}{\sqrt[3]{2}}$	$\sqrt[3]{2^2}$	$-\frac{3}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = -\frac{3\sqrt[3]{4}}{\sqrt[3]{2^3}} = -\frac{3\sqrt[3]{4}}{2}$
$\frac{5}{\sqrt[4]{8}}$	$\sqrt[4]{2}$	$\frac{5}{\sqrt[4]{8}} = \frac{5}{\sqrt[4]{2^3}} = \frac{5}{\sqrt[4]{2^3}} \cdot \frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{2}} = \frac{5\sqrt[4]{2}}{\sqrt[4]{2^4}} = \frac{5\sqrt[4]{2}}{2}$

# Racionalização

**Caso 3:** o denominador é uma soma/diferença envolvendo uma raiz quadrada.

Neste caso, o fator racionalizante será o “conjugado” do denominador.

Exemplo	Fator	Forma racionalizada
$\frac{1}{\sqrt{a} + b}$	$\sqrt{a} - b$	$\frac{1}{\sqrt{a} + b} \cdot \frac{\sqrt{a} - b}{\sqrt{a} - b} = \frac{\sqrt{a} - b}{(\sqrt{a})^2 - \sqrt{a} \cdot b + \sqrt{a} \cdot b - b^2} = \frac{\sqrt{a} - b}{a - b^2}$
$\frac{1}{\sqrt{a} - b}$	$\sqrt{a} + b$	$\frac{1}{\sqrt{a} - b} \cdot \frac{\sqrt{a} + b}{\sqrt{a} + b} = \frac{\sqrt{a} + b}{(\sqrt{a})^2 - \sqrt{a} \cdot b + \sqrt{a} \cdot b - b^2} = \frac{\sqrt{a} + b}{a - b^2}$
$\frac{3}{\sqrt{2} + 1}$	$\sqrt{2} - 1$	$\frac{3}{\sqrt{2} + 1} \cdot \frac{\sqrt{2} - 1}{\sqrt{2} - 1} = \frac{3(\sqrt{2} - 1)}{(\sqrt{2})^2 - \sqrt{2} + \sqrt{2} - (1)^2} = \frac{3\sqrt{2} - 3}{2 - 1} = 3\sqrt{2} - 3$
$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7} - 2}$	$\sqrt{7} + 2$	$\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7} - 2} \cdot \frac{\sqrt{7} + 2}{\sqrt{7} + 2} = \frac{\sqrt{5}(\sqrt{7} + 2)}{(\sqrt{7})^2 - 2\sqrt{7} + 2\sqrt{7} - (2)^2} = \frac{\sqrt{35} + 2\sqrt{5}}{3}$
$\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$	$\sqrt{3} + \sqrt{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{(\sqrt{3})^2 - \sqrt{2}\sqrt{3} + -\sqrt{2}\sqrt{3} - (\sqrt{2})^2} = \sqrt{2} + \sqrt{3}$

# Racionalização

**Exemplo:** Racionalize as frações:

(a)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(b)  $\frac{2}{3\sqrt{5}}$

(c)  $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$

(d)  $\frac{2}{\sqrt[5]{9}}$

(e)  $\frac{1}{3 - \sqrt{2}}$

(f)  $\frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$

**Solução:**

(a)

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{9}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

(b)

$$\frac{2}{3\sqrt{5}} = \frac{2}{3\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{3 \cdot \sqrt{25}} = \frac{2\sqrt{5}}{3 \cdot 5} = \frac{2\sqrt{5}}{15}.$$

(c)

$$\frac{2}{\sqrt[3]{2}} = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^2}} = \frac{2\sqrt[3]{2^2}}{\sqrt[3]{2^3}} = \frac{2\sqrt[3]{2^2}}{2} = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}.$$

(d)

$$\frac{2}{\sqrt[5]{9}} = \frac{2}{\sqrt[5]{3^2}} = \frac{2}{\sqrt[5]{3^2}} \cdot \frac{\sqrt[5]{3^3}}{\sqrt[5]{3^3}} = \frac{2\sqrt[5]{3^3}}{\sqrt[5]{3^5}} = \frac{2\sqrt[5]{3^3}}{3} = \frac{2\sqrt[5]{27}}{3}.$$

# Racionalização

**Exemplo:** Racionalize as frações:

(a)  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(b)  $\frac{2}{3\sqrt{5}}$

(c)  $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$

(d)  $\frac{2}{\sqrt[5]{9}}$

(e)  $\frac{1}{3 - \sqrt{2}}$

(f)  $\frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}}$

**Solução:**

(e)

$$\frac{1}{3 - \sqrt{2}} = \frac{1}{3 - \sqrt{2}} \cdot \frac{3 + \sqrt{2}}{3 + \sqrt{2}} = \frac{3 + \sqrt{2}}{3^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{3 + \sqrt{2}}{9 - 2} = \frac{3 + \sqrt{2}}{7}.$$

(f)

$$\frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{1 + \sqrt{2}} \cdot \frac{1 - \sqrt{2}}{1 - \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}(1 - \sqrt{2})}{1^2 - (\sqrt{2})^2} = \frac{\sqrt{2} - 2}{-1} = 2 - \sqrt{2}.$$



# Exercícios Propostos



# Exercícios

---

1) Simplifique os radicais.

$$(a) \sqrt{576} \quad 24 \qquad (b) \sqrt[3]{64} \quad 4 \qquad (c) \sqrt{12} \quad 2\sqrt{3} \qquad (d) \sqrt[3]{27} \quad 4\sqrt[3]{2}$$

2) Reduza os radicais a seguir e efetue as operações indicadas em cada caso.

$$(a) \sqrt{2} - \sqrt{8} \quad -\sqrt{2} \qquad (c) \sqrt{125} + \sqrt{20} - \sqrt{45} \quad 4\sqrt{5}$$

$$(b) \sqrt{3} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27} \quad 0 \qquad (d) \sqrt[3]{128} + \sqrt[3]{250} + \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{16} \quad 10\sqrt[3]{2}$$

3) Calcule cada produto abaixo:

$$(a) (2\sqrt{5} + 8)(\sqrt{5} - 1) \quad 2 + 6\sqrt{5} \qquad (c) (\sqrt{6} - 2)(9 - \sqrt{6}) \quad 11\sqrt{6} - 24$$

$$(b) (-5 + 3\sqrt{2})(4 - \sqrt{2}) \quad 17\sqrt{2} - 26 \qquad (d) (1 - 2\sqrt{7})(1 + 2\sqrt{7}) \quad -27$$

4) Calcule o valor numérico da expressão

$$8^{\frac{1}{2}} + \sqrt[4]{4} + \sqrt[6]{8} - 32^{\frac{1}{2}} + 128^{\frac{1}{2}} - \sqrt{32} \quad 4\sqrt{2}$$

# Exercícios

5) Efetue as operações com as raízes

(a)  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$

6

(c)  $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[3]{18}$

6

(b)  $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[3]{6}$

$2\sqrt[3]{3}$

(d)  $\sqrt{6} \div \sqrt{3}$

$\sqrt{2}$

6) Introduza cada expressão a seguir em um só radical:

(a)  $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{5}$

$\sqrt[6]{3^3 5^2}$

(c)  $\sqrt[3]{40} \div \sqrt{2}$

$\sqrt[6]{2^3 5^2}$

(b)  $\sqrt[3]{4} \cdot \sqrt[4]{2}$

$\sqrt[12]{2^{11}}$

(d)  $\sqrt{8} \div \sqrt[3]{16}$

$\sqrt[6]{2}$

7) Determine o valor de  $x$  na expressão

$$x = \sqrt{7 + \sqrt[3]{6 + \sqrt[4]{16}}} \quad x = 3$$

# Exercícios

---

8) Racionalize as frações abaixo:

(a)  $\frac{1}{\sqrt{5}}$

$\frac{\sqrt{5}}{5}$

(b)  $\frac{2}{3\sqrt{3}}$

$\frac{2\sqrt{3}}{9}$

(c)  $\frac{\sqrt{x}}{y\sqrt{y}}$

$\frac{\sqrt{xy}}{y^2}$

9) Racionalize as frações abaixo:

(a)  $\frac{3}{\sqrt[3]{3}}$

$\sqrt[3]{9}$

(b)  $\frac{2}{\sqrt[4]{8}}$

$\sqrt[4]{2}$

(c)  $\frac{xy}{\sqrt[5]{x^2y^3}}$

$\sqrt[5]{x^3y^2}$

10) Racionalize as frações abaixo:

(a)  $\frac{1}{\sqrt{2} - 1}$

$\sqrt{2} + 1$

(c)  $\frac{1 + \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 2}$

$\frac{-3\sqrt{2} - 4}{2}$

(b)  $\frac{2}{\sqrt{5} - 1}$

$\frac{\sqrt{5} + 1}{2}$

(d)  $\frac{2 + \sqrt{3}}{2 + \sqrt{2}}$

$\frac{4 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{3} - \sqrt{6}}{2}$

# Exercícios

11) Simplifique os radicais.

$$(a) \sqrt{24} \quad 2\sqrt{6} \quad (b) \sqrt{75} \quad 5\sqrt{3} \quad (c) \sqrt[3]{250} \quad 5\sqrt{2} \quad (d) \sqrt[5]{-972} \quad -5\sqrt{3}$$

12) Reduza os radicais e calcule o valor numérico das expressões.

(a) $\sqrt{3} + \sqrt{48}$	$5\sqrt{3}$	(b) $3\sqrt{32} + 2\sqrt{8} - 2\sqrt{18}$	$\sqrt{2}$
(c) $\sqrt{28} - 10\sqrt{7}$	$-8\sqrt{7}$	(d) $6\sqrt{3} + \sqrt{75}$	$11\sqrt{3}$
(e) $\sqrt{98} + 5\sqrt{18}$	$22\sqrt{2}$	(f) $\sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$	$4\sqrt{3}$
(g) $\sqrt{12} - 9\sqrt{3} + \sqrt{75}$	$-2\sqrt{3}$	(h) $5\sqrt{180} + \sqrt{245} - 17\sqrt{5}$	$20\sqrt{5}$

13) Efetue as operações com raízes:

(a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{7}$	$\sqrt{14}$	(b) $\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{10}$	$\sqrt[3]{50}$	(c) $\sqrt[3]{30} \div \sqrt[3]{10}$	$\sqrt[3]{3}$
(d) $\sqrt[4]{15} \div \sqrt[4]{5}$	$\sqrt[4]{3}$	(e) $(\sqrt{2} - 2) \cdot (3 - \sqrt{2})$	$5\sqrt{2} - 6$		
(f) $(7\sqrt{7} + 1) \cdot (\sqrt{7} - 1)$					
$-6\sqrt{7} + 48$					

# Exercícios

---

14) Para cada expressão reduza a um só radical.

(a)  $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{16}$        $\sqrt[6]{2^3 \cdot 16^2}$

(b)  $\sqrt{5} \cdot \sqrt[3]{15}$        $\sqrt[10]{5^5 \cdot 15^2}$

(c)  $\sqrt[3]{25} \div \sqrt[4]{2}$        $\sqrt[12]{\frac{25^4}{2^3}}$

(d)  $\sqrt[3]{10} \div \sqrt[5]{3}$        $\sqrt[15]{\frac{10^5}{3^3}}$

15) Racionalize as frações abaixo:

(a)  $\frac{5}{\sqrt{3}}$        $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

(b)  $\frac{2}{\sqrt{18}}$        $\frac{\sqrt{18}}{9}$

(c)  $\frac{1}{10\sqrt{7}}$        $\frac{\sqrt{7}}{70}$

(d)  $\frac{5}{\sqrt[5]{25}}$        $\frac{\sqrt[3]{625}}{5}$

(e)  $\frac{1}{\sqrt{3} + 5}$        $\frac{-\sqrt{3}+5}{22}$

(f)  $\frac{2}{2\sqrt{2} - 1}$        $\frac{4\sqrt{2}+2}{7}$

# Monitorias!!

**Não esqueça de procurar os monitores do GAMA para melhor esclarecer suas dúvidas!!**

Os horários e locais de monitorias podem se encontrados na página do Projeto:

<http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>

O GAMA possui monitorias de:

- Pré-cálculo e Matemática Elementar (e disciplinas equivalentes)
- ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica (e disciplinas equivalentes)
  - Cálculo 1, Cálculo 1A e Cálculo I (e disciplinas equivalentes)

Certificado de 20 horas para quem procurar a monitoria do GAMA por pelo menos 15 vezes dentro do mesmo semestre letivo.



# Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Pró-reitoria de Ensino



## Atividades de Reforço em Cálculo

Módulo de

# Matemática Básica

2019/1

## Aula 04

Projeto  
**GAMA**  
Grupo de Apoio em  
Matemática

# Fatoração

De maneira geral, **fatorar** uma expressão significa escrevê-la como um produto de dois ou mais fatores.

Estudaremos a seguir os casos mais comuns de fatoração de expressões algébricas.

## Fatoração por fator comum em evidência

$$mx \pm my = m(x \pm y)$$

Prova da fórmula:

$$\overbrace{m(x + y)}^{m \cdot (x + y)} = mx + my$$

**Exemplo:** Fatore as seguintes expressões:

- (a)  $7x + 7y$       (b)  $10m - 25n$       (c)  $2m - 4n + 10$       (d)  $x^5 + 3x^2$

**Solução:**

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| (a) $7x + 7y = 7(x + y)$     | (c) $2m - 4n + 10 = 2(m - 2n + 5)$ |
| (b) $10m - 25n = 5(2m - 5n)$ | (d) $x^5 + 3x^2 = x^2(x^3 + 3)$    |

# Fatoração

## Fatoração por agrupamento

$$mx + my + nx + ny = (m + n)(x + y)$$

Prova da fórmula:

$$(m + n)(x + y) = mx + my + nx + ny$$

(m + n) (x + y)

Diagrama: Um par de setas curvas apontando para os termos  $m(x+y)$  e  $n(x+y)$  na expressão acima.

**Exemplo:** Fatore as seguintes expressões:

(a)  $xy + 2x + 5y + 10$

(b)  $2xy^2 + 4xy - 6y^2 - 12y$

**Solução:**

(a)

$$xy + 2x + 5y + 10$$

$$= x(y + 2) + 5(y + 2) = (x + 5)(y + 2)$$

(b)

$$2xy^2 + 4xy - 6y^2 - 12y = 2[xy^2 + 2xy - 3y^2 - 6y]$$

$$= 2[x(y^2 + 2y) - 3(y^2 + 2y)]$$

$$= 2(x - 3)(y^2 + 2y) = 2y(x - 3)(y + 2).$$

# Produtos notáveis

Primeiro caso de produtos notáveis:

Quadrado da soma de dois termos

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

Prova da fórmula:

$$(x + y)^2 = (x + y) \cdot (x + y) = x^2 + \underbrace{xy + yx}_{2xy} + y^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

↓  
 quadrado  
 da soma de  
 dois termos

↓  
 quadrado  
 do primeiro

↓  
 mais duas vezes  
 o produto do  
 primeiro pelo  
 segundo

↓  
 quadrado  
 do segundo

**Exemplo:** Fatore as seguintes expressões:

(a)  $x^2 + 4x + 4$

(b)  $x^2 + 6xy + 9y^2$

(c)  $4m^2 + 28m + 49$

**Solução:**

(a)  $x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2x(2) + 2^2 = (x + 2)^2.$

(b)  $x^2 + 6xy + 9y^2 = x^2 + 2x(3y) + (3y)^2 = (x + 3y)^2.$

(c)  $4m^2 + 28m + 49 = (2m)^2 + 2(2m)(7) + (7)^2 = (2m + 7)^2.$

# Produtos notáveis



## Segundo caso de produtos notáveis:

# Quadrado da diferença de dois termos

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

## Prova da fórmula:

$$(x - y)^2 = (x - y) \cdot (x - y) = x^2 - \underbrace{xy - yx}_{-2xy} + y^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

↓  
 quadrado da  
 diferença de  
 dois termos

↓  
 menos duas vezes  
 o produto do  
 primeiro pelo  
 segundo

↓  
 quadrado  
 do  
 segundo

**Exemplo:** Fatore as seguintes expressões:

$$(a) x^2 - 6x + 9$$

$$(b) x^2 - 4xy + 4y^2$$

(c)  $x^2 - 2x\sqrt{3} + 3$

## Solução:

$$(a) x^2 - 6x + 9 = x^2 - 2x(3) + 3^2 = (x - 3)^2.$$

$$(b) x^2 - 4xy + 4y^2 = x^2 - 2x(2y) + (2y)^2 = (x - 2y)^2.$$

$$(c) \ x^2 - 2x\sqrt{3} + 3 = x^2 - 2x(\sqrt{3}) + (\sqrt{3})^2 = (x - \sqrt{3})^2.$$

# Produtos notáveis

Terceiro caso de produtos notáveis:

Diferença de dois quadrados

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

Prova da fórmula:

$$(x + y) \cdot (x - y) = x^2 - \cancel{xy} + \cancel{yx} - y^2 = x^2 - y^2$$

Produto da soma pela diferença de dois termos

↓                      ↓  
 quadrado do primeiro      quadrado do segundo

**Exemplo:** Fatore as seguintes expressões:

(a)  $x^2 - 9$

(b)  $4y^2 - 25$

(c)  $m^4 - 4$

**Solução:**

(a)  $x^2 - 9 = (x + 3)(x - 3)$ .

(b)  $4y^2 - 25 = (2y + 5)(2y - 5)$ .

(c)  $m^4 - 4 = (m^2 + 2)(m^2 - 2) = (m^2 + 2)(m + \sqrt{2})(m - \sqrt{2})$ .

# Produtos notáveis

Quarto caso de  
produtos notáveis:

Diferença de dois cubos

$$x^3 - y^3 = (x - y) \cdot (x^2 + xy + y^2)$$

Prova da fórmula:

$$(x - y) \cdot (x^2 + xy + y^2) = x^3 + x^2y + xy^2 - yx^2 - xy^2 - y^3 = x^3 - y^3$$

**Exemplo:** Fatore as seguintes expressões:

(a)  $x^3 - 27$

(b)  $8n^3 - 125$

(c)  $y^3 - 2$

**Solução:**

(a)  $x^3 - 27 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9).$

(b)  $8n^3 - 125 = (2n - 5)(4n^2 + 10n + 25).$

(c)  $y^3 - 2 = (y - \sqrt[3]{2})(y^2 + y\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}).$

# Fatoração do trinômio do segundo grau

Um importante caso de fatoração é chamado de fatoração do **trinômio de segundo grau**.

$$ax^2 + bx + c$$

(trinômio pois há três termos na expressão e de segundo grau, pois o maior expoente é dois).

Lembre que, para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, utiliza-se a **fórmula de Bháskara**.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

fórmula de Bháskara

**Fatoração do trinômio do segundo grau**

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$x_1$  e  $x_2$  são as raízes da equação de segundo grau

# Fatoração do trinômio do segundo grau

**Exemplo:** Fatore a expressão  $x^2 + 3x - 4$ .

**Solução:** Neste caso, tem-se  $a = 1$ ,  $b = 3$  e  $c = -4$ .

Aplicando a fórmula de Bháskara, tem-se

$$x = \frac{-(3) \pm \sqrt{(3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4)}}{2 \cdot 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{2}$$

$$= \frac{-3 \pm 5}{2}$$

$$\begin{array}{ccc} x_1 & = & \frac{-3 + 5}{2} = \frac{2}{2} = 1 \\ & \nearrow & \\ & & x_2 = \frac{-3 - 5}{2} = \frac{-8}{2} = -4 \\ \searrow & & \end{array}$$

Obtém-se duas raízes reais e distintas dadas por  $x_1 = 1$  e  $x_2 = -4$ .

Reescrevendo o trinômio dado na forma fatorada, tem-se

$$x^2 + 3x - 4 = \underbrace{1}_{a} \cdot \underbrace{(x - 1)}_{x - x_1} \underbrace{(x + 4)}_{x - x_2} = (x - 1)(x + 4).$$

# Fatoração do trinômio do segundo grau

**Exemplo:** Fatore a expressão  $x^2 - 6x + 9$ .

**Solução:** Neste caso, tem-se  $a = 1$ ,  $b = -6$  e  $c = 9$ .

Aplicando a fórmula de Bháskara, tem-se

$$x = \frac{-(-6) \pm \sqrt{(-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (9)}}{2 \cdot 1} = \frac{6 \pm \sqrt{36 - 36}}{2}$$

$$= \frac{6 \pm 0}{2}$$

$$\begin{array}{l} x_1 = \frac{6+0}{2} = \frac{6}{2} = 3 \\ x_2 = \frac{6-0}{2} = \frac{6}{2} = 3 \end{array}$$

Obtém-se duas raízes e idênticas  $x_{1,2} = 3$ .

Reescrevendo o trinômio dado na forma fatorada, tem-se

$$x^2 - 6x + 9 = \underbrace{1}_{a} \cdot \underbrace{(x - 3)}_{x - x_1} \underbrace{(x - 3)}_{x - x_2} = (x - 3)^2$$

**Observação:** Note que esta fatoração é um caso de trinômio quadrado perfeito.

# Fatoração e produtos notáveis

Fator comum em evidência

$$mx + my = m(x + y)$$

Agrupamento

$$mx + my + nx + ny = (m + n)(x + y)$$

Fatoração por produtos notáveis

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

Quadrado da soma  
de dois termos

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

Quadrado da diferença  
de dois termos

$$(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$$

Produto da soma pela diferença  
de dois termos

$$x^3 - y^3 = (x - y) \cdot (x^2 + xy + y^2)$$

Diferença de dois cubos

Fatoração do trinômio do segundo grau

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$x_1$  e  $x_2$  são as raízes da equação  
de segundo grau



# Exercícios Propostos



# Exercícios

---

1) Fatore cada expressão algébrica:

(a)  $xy - x$     $x(y - 1)$

(b)  $25xy - 5xy^2 + 15x^2y^2$     $5xy(5 - y + 3xy)$

(c)  $4y^6 + 4y^5 + y + 1$     $(y + 1)(4y^5 + 1)$

(d)  $2a^3 + 6ax - 3a^2b - 9bx$     $(a^2 + 3x)(2a - 3b)$

(e)  $3x^2y^2 - 12xy + 12$     $3(xy - 2)^2$

(f)  $y^4 - 6mxy^2 + 9m^2x^2$     $(y^2 - 3mx)^2$

(g)  $9a^2x^2 - 6ab^3x + b^6$     $(3ax - b^3)^2$

(h)  $100 - x^2y^2$     $(10 - xy)(10 + xy)$

(i)  $ax^2 - ay^2$     $a(x - y)(x + y)$

(j)  $25x^3 - 16x$     $x(5x - 4)(5x + 4)$

(k)  $x^2 - x - 12$     $(x + 3)(x - 4)$

(l)  $2x^2 - 6x + 4$     $2(x - 1)(x - 2)$

# Exercícios

---

2) Fatore cada expressão algébrica:

(a)  $4x - 3xy$        $x(4 - 3y)$

(b)  $xy + y^2 - y$        $y(x + y - 1)$

(c)  $\frac{1}{3}x + \frac{1}{6}y$        $\frac{1}{3}(x + \frac{1}{2}y)$

(d)  $x^2 - 81$        $(x + 9)(x - 9)$

(e)  $100 - x^2$        $(10 + x)(10 - x)$

(f)  $x^2 - \frac{4}{25}$        $(x + \frac{2}{5})(x - \frac{2}{5})$

(g)  $1 - x^2y^2$        $(1 + xy)(1 - xy)$

(h)  $x^{10} - 100$        $(x^5 + 10)(x^5 - 10)$

(i)  $4x^2 - 12xy + 9y^2$        $(2x - 3y)^2$

(j)  $y^2 + 10y + 25$        $(y + 5)^2$

(k)  $121x^2y^2 + 44xy + 4$        $(11xy + 2)^2$

(l)  $a^4 - b^4$        $(a^2 + b^2)(a + b)(a - b)$

# Monitorias!!

**Não esqueça de procurar os monitores do GAMA para melhor esclarecer suas dúvidas!!**

Os horários e locais de monitorias podem se encontrados na página do Projeto:

<http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>

O GAMA possui monitorias de:

- Pré-cálculo e Matemática Elementar (e disciplinas equivalentes)
- ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica (e disciplinas equivalentes)
  - Cálculo 1, Cálculo 1A e Cálculo I (e disciplinas equivalentes)

Certificado de 20 horas para quem procurar a monitoria do GAMA por pelo menos 15 vezes dentro do mesmo semestre letivo.



# Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Pró-reitoria de Ensino



## Atividades de Reforço em Cálculo

Módulo de

# Matemática Básica

2019/1

## Aula 05

Projeto  
**GAMA**  
Grupo de Apoio em  
Matemática

# Expressões algébricas

**Definição:** Chama-se **expressão algébrica** toda expressão na qual estão presentes letras ou símbolos que denotam grandezas genéricas ou desconhecidas, que são chamadas de incógnitas ou variáveis.


**Exemplo:** Considere um retângulo de base  $3\text{ m}$  e altura  $x\text{ m}$ . Expresse a área e o perímetro desse retângulo.

**Solução:**

Neste caso, a área e o perímetro do retângulo são expressões algébricas com incógnita  $x$ .

$$A = 3 \cdot x$$

$$P = 2x + 6$$



**Exemplo:** Se  $V$  é uma quantia de dinheiro que uma pessoa possui e o custo de um refrigerante é R\$ 2,00 e de um pastel é R\$ 3,00; escreva uma expressão que calcule o troco que ela receberá ao comprar  $x$  refrigerantes e  $y$  pastéis.

**Solução:**

$$T = V - 2x - 3y$$

Neste caso, o valor do troco é uma expressão algébrica com incógnitas  $V$ ,  $x$  e  $y$ .

# Valor numérico

**Definição:** O **valor numérico** de uma expressão algébrica é obtido quando se substitui a incógnita por um número em particular.

**Exemplo:** Considere a expressão algébrica:

$$y = \frac{2m - n}{n + 2}.$$

Calcule o valor numérico desta expressão para

$$m = \frac{1}{3} \quad \text{e} \quad n = -\frac{2}{5}.$$

**Solução:** Substituindo os valores atribuídos a  $m$  e  $n$  na expressão algébrica, obtém-se:

$$y = \frac{2m - n}{n + 2} = \frac{2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{2}{5}\right)}{\left(-\frac{2}{5}\right) + 2} = \frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{5}}{\frac{-2 + 10}{5}} = \frac{\frac{10 + 6}{15}}{\frac{8}{5}} = \frac{16}{15} \cdot \frac{5}{8} = \frac{2}{3}.$$

# Simplificação de frações algébricas

Um caso particularmente interessante de expressões algébricas são as **frações algébricas**.

**Exemplo:** São exemplos de frações algébricas:

$$(a) \frac{y}{x} \quad (b) \frac{2}{xy} \quad (c) \frac{3x^2y^3}{z^3wt^5} \quad (d) \frac{x+y}{1+z} \quad (e) \frac{x^2 + 3xy - 5}{2z - 3}$$

As **simplificações de frações algébricas** são efetuadas de forma similar às efetuadas com frações numéricas, ou seja, podem ser simplificados somente os fatores comuns ao numerador e ao denominador da fração.

**Exemplo:** Simplifique a expressão:

$$\frac{15xy^3w^2}{20x^4y}$$

**Solução:**

$$\frac{15xy^3w^2}{20x^4y} = \frac{3y^2w^2}{4x^3}.$$

# Simplificação de frações algébricas

Em alguns casos pode ser extremamente útil utilizar fatoração e produtos notáveis para simplificar uma fração algébrica.

**Exemplo:** Simplifique as expressões:

(a) 
$$\frac{x^2 - y^2}{4x + 4y}$$

(b) 
$$\frac{m^2 - 2mn + n^2}{m^2 - n^2}$$

(c) 
$$\frac{x^3y - 2x^2y^2}{x^2 - 4xy + 4y^2}$$

**Solução:**

(a) 
$$\frac{x^2 - y^2}{4x + 4y} = \frac{(x + y)(x - y)}{4(x + y)} = \frac{x - y}{4}.$$

(b) 
$$\frac{m^2 - 2mn + n^2}{m^2 - n^2} = \frac{(m - n)(m - n)}{(m - n)(m + n)} = \frac{m - n}{m + n}.$$

(c) 
$$\frac{x^3y - 2x^2y^2}{x^2 - 4xy + 4y^2} = \frac{x^2y(x - 2y)}{(x - 2y)(x - 2y)} = \frac{x^2y}{x - 2y}.$$

# Multiplicação/divisão de frações algébricas

Assim como foi definida a multiplicação/divisão/potências de números racionais, efetua-se a multiplicação/divisão/potências de frações algébricas.

**Exemplo.** Calcule:

$$(a) \frac{3x}{x+1} \cdot \frac{x-2}{3x+1}$$

$$(b) \frac{3-x}{x^2+x} \div \frac{2x^2}{x+1}$$

$$(c) \left( \frac{x+2}{2y} \right)^{-2}$$

**Solução:**

(a)

$$\frac{3x}{x+1} \cdot \frac{x-2}{3x+1} = \frac{3x(x-2)}{(x+1)(3x+1)} = \frac{3x^2 - 6x}{3x^2 + x + 3x + 1} = \frac{3x^2 - 6x}{3x^2 + 4x + 1}.$$

(b)

$$\frac{3-x}{x^2+x} \div \frac{2x^2}{x+1} = \frac{3-x}{x^2+x} \cdot \frac{x+1}{2x^2} = \frac{3-x}{x(x+1)} \cdot \frac{x+1}{2x^2} = \frac{3-x}{2x^3}.$$

(c)

$$\left( \frac{x+2}{2y} \right)^{-2} = \left( \frac{2y}{x+2} \right)^2 = \frac{(2y)^2}{(x+2)^2} = \frac{4y^2}{x^2 + 4x + 4}.$$

# Soma/subtração de frações algébricas

Assim como foi definida a soma/subtração de frações, efetua-se a **soma/subtração de frações algébricas**. Observe que o método para encontrar o *mmc* dos denominadores é bastante similar ao utilizado para números racionais.

**Exemplo:** Calcule:

$$(a) \frac{2x - 3}{x} - \frac{2}{3x}$$

$$(b) \frac{x + 2}{2x} - \frac{x - 1}{3x^2} + \frac{2x - 1}{6x}$$

**Solução:** (a) Como  $\text{mmc}(x, 3x) = 3x$ , tem-se

$$\frac{2x - 3}{x} - \frac{2}{3x} = \frac{3(2x - 3) - 2}{3x} = \frac{6x - 9 - 2}{3x} = \frac{6x - 11}{3x}.$$

(b) Como  $\text{mmc}(2x, 3x^2, 6x) = 6x^2$ , tem-se

$$\begin{aligned} \frac{x + 2}{2x} - \frac{x - 1}{3x^2} + \frac{2x - 1}{6x} &= \frac{3x(x + 2) - 2(x - 1) + x(2x - 1)}{6x^2} \\ &= \frac{3x^2 + 6x - 2x + 2 + 2x^2 - x}{6x^2} = \frac{5x^2 + 3x + 2}{6x^2}. \end{aligned}$$

# Soma/subtração de frações algébricas

**Exemplo.** Calcule:

$$(a) \frac{x+2}{2x} + \frac{3}{x-1}$$

$$(b) \frac{x+1}{x^2-4} - \frac{2}{x-2} - \frac{5x-1}{3x}$$

**Solução:**

(a) Como  $mmc(2x, x-1) = 2x(x-1)$ , tem-se

$$\frac{x+2}{2x} + \frac{3}{x-1} = \frac{(x+2)(x-1) + 3(2x)}{2x(x-1)} = \frac{x^2 + x - 2 + 6x}{2x^2 - 2x} = \frac{x^2 + 7x - 2}{2x^2 - 2x}.$$

(b) Como  $mmc(x^2 - 4, x-2, 3x) = 3x(x^2 - 4)$ , tem-se

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{x^2-4} - \frac{2}{x-2} - \frac{5x-1}{3x} &= \frac{3x(x+1) - 2(3x)(x+2) - (5x-1)(x^2-4)}{3x(x^2-4)} \\ &= \frac{3x^2 + 3x - 6x^2 - 12x - 5x^3 + 20x + x^2 - 4}{3x(x^2-4)} = \frac{-5x^3 - 2x^2 + 11x - 4}{3x^3 - 12x}. \end{aligned}$$



# Exercícios Propostos



# Exercícios

---

1) Considere um pedaço de cartolina retangular de lados  $x \text{ cm}$  e  $y \text{ cm}$ .

Deseja-se montar uma caixa, em forma de paralelepípedo retângulo, sem a tampa de cima com esta cartolina.

Para isto, de cada ponta do retângulo vai-se tirar um quadrado de lado  $2 \text{ cm}$  (estamos então considerando  $x > 4$  e  $y > 4$ ).

Com estas informações, monte a expressão que informa o volume dessa caixa.

$$V = 2 \cdot (x - 4) \cdot (y - 4)$$

2) Em cada caso, calcule o valor numérico:

$$(a) M = 3xy - y, \text{ para } x = -\frac{1}{2} \text{ e } y = -\frac{2}{5} \quad M = 1$$

$$(b) M = \frac{x+2y}{y-x}, \text{ para } x = \frac{2}{3} \text{ e } y = -\frac{1}{7} \quad M = -\frac{8}{17}$$

# Exercícios

---

3) Simplifique cada fração algébrica:

$$(a) \frac{20x^3y^2z^4}{15x^6y^6z}$$

$$\frac{4z^3}{3x^3y^4}$$

$$(d) \frac{xy + y + 5x + 5}{3y + 15}$$

$$\frac{x+1}{3}$$

$$(b) \frac{x-5}{x^2-25}$$

$$\frac{1}{x+5}$$

$$(e) \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 - y^2}$$

$$\frac{x+y}{x-y}$$

$$(c) \frac{x^2 - y^2}{xy + y^2}$$

$$\frac{x-y}{y}$$

$$(f) \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9}$$

$$\frac{x-2}{x+3}$$

4) Efetue as operações seguintes e simplifique:

$$(a) \left( \frac{-4m^2n^5p}{3r^2t^7} \right)^2$$

$$\frac{16m^4n^{10}p^2}{9r^4t^{14}}$$

$$(c) \frac{x+y}{7x-7y} \div \frac{x^2 + xy}{7x}$$

$$\frac{1}{x-y}$$

$$(b) \frac{x+3}{x-4} \cdot \frac{x^2 - 8x + 16}{x^2 - 9}$$

$$\frac{(x-4)}{(x-3)}$$

$$(d) \left( \frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) \div \left( \frac{x}{y} + 1 \right)$$

$$1 - \frac{y}{x}$$

# Exercícios

---

5) Efetue as operações seguintes e simplifique:

$$(a) \frac{4x^2 - 7xy}{3x^2} + \frac{8y^2 - 3x}{6x} - \frac{5}{12}$$

$$\frac{5x - 28y + 16y^2}{12x}$$

$$(b) \frac{5}{2x+2} - \frac{7}{3x-3} + \frac{1}{6x-6}$$

$$\frac{x-14}{3(x-1)(x+1)}$$

$$(c) \frac{x+1}{2x-2} - \frac{x-1}{2x+2} + \frac{4x}{x^2-1}$$

$$\frac{6x}{(x-1)(x+1)}$$

$$(d) \frac{4t^2}{t^2-s^2} - \frac{t-s}{t+s} + \frac{t+s}{t-s}$$

$$\frac{4t}{t-s}$$

6) Simplifique a seguinte expressão:

$$\frac{\frac{x^2}{y^2} - \frac{y^2}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{xy} + \frac{1}{y^2}}$$

$$\frac{(x-y)(x^2+y^2)}{x+y}$$

# Exercícios

---

7) Peça a um amigo para pensar em um número, multiplicá-lo por 3, somar 6, multiplicar por 4 e dividir por 12, dizendo para você o resultado final. Você pode então “adivinar” qual o número em que seu amigo pensou. Parece mágica, não é? Como isto é possível?

O resultado é  $y = x + 2$ , então o número pensado é  $x = y - 2$ , pois  $y = \frac{(3x+6)\cdot 4}{12}$

8) Determine o valor da expressão  $a^{-3} \cdot \sqrt[3]{b} \cdot c^{-1}$ , quando  $a = -1$ ,  $b = -8$  e  $c = \frac{1}{4}$

8

9) Calcule o valor numérico de cada expressão abaixo:

(a)  $M = x^2y - y^2$ , para  $x = 2$  e  $y = -1$        $M = -5$

(b)  $M = \frac{(x+y)^{-1}}{x^{-1}+y^{-1}}$ , para  $x = -\frac{2}{5}$  e  $y = 5$        $M = \frac{50}{23^2}$

# Exercícios

---

10) Simplifique cada fração algébrica:

$$(a) \frac{a - 2x}{2bx - ab}$$

$$-\frac{1}{b}$$

$$(d) \frac{x^4 - 1}{x^4 + 2x^2 + 1}$$

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

$$(b) \frac{x^2 - 4xy + 4y^2}{x^2 - 4y^2}$$

$$\frac{x - 2y}{x + 2y}$$

$$(e) \frac{x^2 - x - 6}{2x^2 + 4x}$$

$$\frac{x - 3}{2x}$$

$$(c) \frac{x^2 - y^2}{x^2 - 2xy + y^2}$$

$$\frac{x + y}{x - y}$$

$$(f) \frac{x^2 + 4x - 5}{x^2 - 2x + 1}$$

$$\frac{x + 5}{x - 1}$$

# Exercícios

---

11) Efetue as operações seguintes e simplifique:

$$(a) \frac{x^2 - 256}{x^2 + xy + 4x + 4y} \cdot \frac{x^2 - y^2}{2x - 8}$$

$$\frac{(x^2 + 16)(x - y)}{2}$$

$$(b) \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x - y} \div \frac{x + y}{x^2 - 2xy + y^2}$$

$$(x - y)(x + y)$$

$$(c) \left(1 + \frac{x - a}{x + a}\right) \div \left(1 - \frac{x - a}{x + a}\right)$$

$$\frac{x}{a}$$

$$(d) \frac{m^2 - 36}{x^2 y^2} \div \frac{2m + 12}{x y^2}$$

$$\frac{m - 6}{2x}$$

$$(e) \left(\frac{3x^{\frac{3}{2}}y^3}{x^2y^{-\frac{1}{2}}}\right)^{-2}$$

$$\frac{x}{9y^7}$$

$$(f) \frac{2}{a + b} \div \frac{4}{ax + bx}$$

$$\frac{x}{2}$$

# Exercícios

---

12) Calcule o valor numérico de cada expressão abaixo:

(a)  $M = \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x}}$ , para  $x = 4$  4

(b)  $M = x^2 - 2xy + y^2$ , para  $x = -1$  e  $y = \frac{1}{4}$  \frac{25}{16}

(c)  $M = \sqrt{\frac{a^2 + ax}{y}}$ , para  $\alpha = 8$ ,  $x = 10$  e  $y = 9$  4

(d)  $M = \frac{y + \frac{1}{x}}{x + \frac{1}{y}}$ , para  $x = 10$  e  $y = 5$  \frac{1}{2}

13) Simplifique cada fração algébrica

(a)  $\frac{ac - c}{c^2 - c}$

\frac{a-1}{c-1}

(b)  $\frac{3x + 3y}{3 - 3a}$

\frac{x+y}{1-a}

(c)  $\frac{a^2 - b^2}{a^3 - a^2 b}$

\frac{a+b}{a^2}

(d)  $\frac{x^2 - 8x + 16}{x^2 - 16}$

\frac{x-4}{x+4}

# Exercícios

---

14) Efetue as operações seguintes e simplifique:

$$(a) \frac{x+y}{y} - \frac{y}{x+y} - \frac{2x}{x+y} \quad \frac{x^2}{y(x+y)}$$

$$(b) \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x-1} + \frac{2x}{x^2-1} \quad \frac{2}{x+1}$$

$$(c) \frac{x}{a+1} \div \frac{x^4}{a^2-1} \quad \frac{a-1}{x^3}$$

$$(d) \frac{a^2-1}{x^2-y^2} \div \frac{a^2-2a+1}{3x+3y} \quad \frac{3(a-1)}{x-y}$$

$$(e) \frac{m^2-36}{x^2y^2} \div \frac{2m+12}{xy^2} \quad \frac{m-6}{2x}$$

$$(f) \frac{3a^4}{x^7+x^6} \div \frac{9a^4}{2x+2} \quad 2$$

# Monitorias!!

**Não esqueça de procurar os monitores do GAMA para melhor esclarecer suas dúvidas!!**

Os horários e locais de monitorias podem se encontrados na página do Projeto:

<http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>

O GAMA possui monitorias de:

- Pré-cálculo e Matemática Elementar (e disciplinas equivalentes)
- ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica (e disciplinas equivalentes)
  - Cálculo 1, Cálculo 1A e Cálculo I (e disciplinas equivalentes)

Certificado de 20 horas para quem procurar a monitoria do GAMA por pelo menos 15 vezes dentro do mesmo semestre letivo.



# Universidade Federal de Pelotas

Instituto de Física e Matemática

Pró-reitoria de Ensino



## Atividades de Reforço em Cálculo

Módulo de

## Matemática Básica

2019/1

### Aula 06

Projeto  
**GAMA**  
Grupo de Apoio em  
Matemática

# Polinômios

**Definição:** Chama-se um polinômio de grau  $n$  na variável  $x$  a expressão  $p(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$ , onde  $a_1, a_2, \dots, a_n$  são os coeficientes do polinômio com  $a_n \neq 0$ .

**Exemplos:**

$$p(x) = 3x^3 - 5x + 1 \quad \text{polinômio de grau três, ou de terceiro grau.}$$

$$q(x) = -x^5 + 2x^2 \quad \text{polinômio de grau cinco, ou de quinto grau.}$$

$$v(x) = 8 \quad \text{polinômio de grau zero.}$$

# Operações com polinômios

Para **somar dois polinômios** somam-se os coeficientes dos termos de mesmo grau.

O mesmo é feito ao efetuar a **diferença de dois polinômios**.

**Exemplo:** Dados os polinômios

$$p(x) = 3x^4 - x^3 - 5x + 1 \text{ e } q(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 7$$

Calcule:

- (a) a soma  $p(x) + q(x)$       (b) a diferença  $p(x) - q(x)$

**Solução:**

$$\begin{aligned} (a) \quad p(x) + q(x) &= (3x^4 - x^3 - 5x + 1) + (2x^3 - x^2 + 3x - 7) \\ &= 3x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 6. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad p(x) - q(x) &= (3x^4 - x^3 - 5x + 1) - (2x^3 - x^2 + 3x - 7) \\ &= (3x^4 - x^3 - 5x + 1) - 2x^3 + x^2 - 3x + 7 \\ &= 3x^4 - x^3 - 2x^3 + x^2 - 5x - 3x + 1 + 7 \\ &= 3x^4 - 3x^3 + x^2 - 8x + 8. \end{aligned}$$

# Operações com polinômios

Já para efetuar o **produto de polinômios** usamos propriedades distributivas, regras de sinais e propriedades de potência dos expoentes de  $x$ .

**Exemplo:** Calcule:

$$(a) x \cdot (x - 1) \quad (b) (x + 1) \cdot (2x - x^2) \quad (c) (x^2 - 3x + 1) \cdot (x^2 - x)$$

**Solução:**

(a)

$$x \cdot (x - 1) = x^2 - x.$$

(b)

$$(x + 1) \cdot (2x - x^2) = 2x^2 - x^3 + 2x - x^2 = -x^3 + x^2 + 2x.$$

(c)

$$\begin{aligned} (x^2 - 3x + 1) \cdot (x^2 - x) &= x^4 - x^3 - 3x^3 + 3x^2 + x^2 - x \\ &= x^4 - 4x^3 + 4x^2 - x. \end{aligned}$$

# Operações com polinômios

Para efetuar a **divisão de polinômios** precisamos recorrer a um procedimento de divisão muito semelhante ao algoritmo para divisão de números inteiros, como no exemplo a seguir.

**Exemplo:** Em cada caso, efetue a divisão dos polinômios

$$(a) (x^2 - 5x + 6) \div (x - 2)$$

$$(b) (x^4 - x^2 + 1) \div (x^2 - 2x + 3)$$

**Solução:**

(a)

Dividendo		Divisor
$x^2 - 5x + 6$		$x - 2$
$-x^2 + 2x$		$\cancel{x - 3}$
<hr/>		Quociente
$-3x + 6$		
$3x - 6$		
<hr/>		
0		
		Resto

Portanto

$$x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$$

(b)

Dividendo		Divisor
$x^4 + 0x^3 - x^2 + 0x + 1$		$x^2 - 2x + 3$
$-x^4 + 2x^3 - 3x^2$		$\cancel{x^2 + 2x}$
<hr/>		Quociente
$2x^3 - 4x^2 + 0x + 1$		
$-2x^3 + 4x^2 - 6x$		
<hr/>		
-6x + 1		
		Resto

Portanto

$$(x^4 - x^2 + 1) = (x^2 - 2x + 3)(x^2 + 2x) - 6x + 1$$

# Dispositivo Prático de Briot- Ruffini


O Dispositivo Prático de Briot-Ruffini é um método prático para efetuar a divisão de um polinômio

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

por um binômio do primeiro grau

$$q(x) = x - a$$

O primeiro passo consiste em dispor os valores de  $a$  e os coeficientes do polinômio (em ordem decrescente em relação ao grau) da seguinte forma:



Vamos mostrar como este dispositivo é aplicado por meio de um exemplo resolvido!

# Dispositivo Prático de Briot- Ruffini

**Exemplo:** Efetue  $(2x^3 + 3x^2 - 3x + 5) \div (x - 1)$ .

**Solução:**

**Passo 01**

1	2	3	-3	5
$a$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$

**Passo 04**

1	2	3	-3	5
$\underline{-}$	2	5	2	7

**Passo 02**

1	2	3	-3	5
$\underline{\times} 1$	2	5	2	7

multiplica      desce      resultado

**Passo 05**

1	2	3	-3	5
	2	5	2	7

$2x^2 + 5x + 2$       resto  
quociente

**Passo 03**

1	2	3	-3	5
$\underline{\times} 2$	2	5	2	7

multiplica      resultado

**Observação:** O número de “passos” dependerá do grau do polinômio.

# Dispositivo Prático de Briot- Ruffini

Exemplo: Efetue  $(x^4 + 3x^3 - 2x - 6) \div (x + 3)$ .

Solução:

Passo 01

-3	1	3	0	-2	-6
$a$	$a_4$	$a_3$	$a_2$	$a_1$	$a_0$

Passo 02

-3	1	3	0	-2	-6
multiplica					

Soma

desce resultado

Passo 03

-3	1	3	0	-2	-6
multiplica					

Soma

resultado

Passo 04

-3	1	3	0	-2	-6
multiplica					

Soma

resultado

Passo 05

-3	1	3	0	-2	-6
multiplica					

Soma

resultado

Passo 06

-3	1	3	0	-2	-6
	1	0	0	-2	0

$x^3 - 2$   
quociente

resto



# Exercícios Propostos



# Exercícios

---

1) Efetue as seguintes operações com polinômios:

(a)  $(x^3 - 3x^2 + 1) + (1 - 3x^2 - x^3)$        $-6x^2 + 2$

(b)  $(2x^3 - 7x + 3) - (4x^3 - x^2 - 3x)$        $-2x^3 + x^2 - 4x + 3$

(c)  $(3x^2 - 4x + 2) \cdot (x^3 - 2x)$        $3x^5 - 4x^4 - 4x^3 + 8x^2 - 4x$

(d)  $(-2x^3 - 3x^2 + 4x + 1) \div (x^2 + 1)$        $-2x - 3$  e resto  $6x + 4$

(e)  $(2x^5 - x^4 - 14x^3 + 9x^2 - 4x + 1) \div (2x^3 + 5x^2 - x + 1)$        $x^2 - 3x + 1$

(f)  $(x^2 - x - 12) \div (x - 4)$        $x + 3$

(g)  $(2x^5 - 3x^3 + 4x - 3) \div (x - 1)$        $2x^4 + 2x^3 - x^2 - x + 3$

(h)  $(2x^4 - 3x^3 - 3) \div (x + 1)$        $2x^3 - 5x^2 + 5x - 5$  e resto  $2$

# Exercícios

---

2) Efetue as seguintes operações com polinômios:

(a)  $(4x^5 - 3x^3 - x^2) + (7x^4 - 2x^3 + 2x^2 - x + 2)$      $4x^5 + 7x^4 - 5x^3 + x^2 - x + 2$

(b)  $(1 - x) - (x^3 - 4x^5 - x + 2)$      $4x^5 - x^3 - 1$

(c)  $(x^2 - 4x + 1) \cdot (3x^2 - x - 1)$      $3x^4 - 13x^3 + 6x^2 + 3x - 1$

(d)  $(3x^5 + 2x^4 + x^2 - 5) \div (-x^2 + x - 1)$      $-3x^3 - 5x^2 - 2x + 2$  e resto  $-4x - 3$

(e)  $(x^4 - 4x^3 + 2x^2 - x - 3) \div (2x^2 + x + 1)$      $\frac{x^2}{2} - \frac{9x}{4} + \frac{15}{8}$     e resto     $-\frac{5x + 39}{8}$

(f)  $(x^2 - x - 6) \div (x + 2)$      $x - 3$

(g)  $(x^5 + 1) \div (x + 1)$      $x^4 - x^3 + x^2 - x + 1$

(h)  $(x^5 - 4x^4 - 2x^2 - 3x + 2) \div (x - 4)$      $x^4 - 2x - 11$  e resto  $-42$

# Monitorias!!

**Não esqueça de procurar os monitores do GAMA para melhor esclarecer suas dúvidas!!**

Os horários e locais de monitorias podem se encontrados na página do Projeto:

<http://wp.ufpel.edu.br/projetogama/>

O GAMA possui monitorias de:

- Pré-cálculo e Matemática Elementar (e disciplinas equivalentes)
- ALGA – Álgebra Linear e Geometria Analítica (e disciplinas equivalentes)
  - Cálculo 1, Cálculo 1A e Cálculo I (e disciplinas equivalentes)

Certificado de 20 horas para quem procurar a monitoria do GAMA por pelo menos 15 vezes dentro do mesmo semestre letivo.