

**Fundação Universidade Federal de Pelotas**  
**Curso de Licenciatura em Matemática**  
**Disciplina de Análise Real I - Prof. Dr. Maurício Zahn**  
**Lista 11 de Exercícios**  
**(Continuidade)**

1. Prove que a função  $f : (-\infty, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = \sqrt{1-x}$  é contínua em todo o seu domínio.
2. Prove que a função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = a^x$  é contínua.  
(Sugestão:  $|a^x - a^b| = a^b |a^{x-b} - 1|$ )
3. Mostre que a função real definida por

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \operatorname{sen} \frac{1}{x}, & \text{se } x \neq 0 \\ 0, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

é contínua em  $x = 0$ .

4. Mostre que toda função  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$  é contínua.
5. **(Sel. Mestr. UFRGS 2003/2)** Mostre que a função  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $f(x) = 1$  se  $x$  é racional e  $f(x) = 0$  se  $x$  é irracional **não** é contínua em nenhum ponto.
6. Seja  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  contínua tal que,  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in [a, b]$  tal que

$$|f(x_n) - x_n| < \frac{1}{n}.$$

Prove que existe  $x \in [a, b]$  tal que  $f(x) = x$ . (**Sugestão:** Use o Teorema de Bolzano-Weierstrass).

7. **(Sel. Mestr. UFRGS 2011/2)**

- (a) Uma função  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  definida em um intervalo  $I$  da reta diz-se Lipschitz se existe uma constante  $K > 0$  tal que

$$x, y \in I \Rightarrow |f(x) - f(y)| < K|x - y|.$$

Prove que se  $f$  é Lipschitz, então  $f$  é contínua.

- (b) Prove que se duas funções  $f$  e  $g$  são Lipschitz e definidas em um mesmo intervalo  $I$ , então  $f + g$  é Lipschitz.
- (c) Prove que uma função Lipschitz  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  definida em um intervalo  $I$  limitado da reta, é uma função limitada.
- (d) Prove que se  $f$  e  $g$  são duas funções Lipschitz definidas em um mesmo intervalo limitado  $I$ , então o produto  $f \cdot g$  é Lipschitz.

8. (Sel. Mestr. UFRGS 2005/2) Seja  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua não decrescente.

(a) Prove que

$$f(b) = \sup_{x \in (a, b)} f(x). \quad (1)$$

(b) Mostre que a igualdade (1) pode ser falsa se não requerermos que  $f$  seja contínua.

9. Dada a função real de variável real  $f(x) = 4 + 3x - x^2$ . Use o Teorema do Valor intermediário para mostrar que existe um  $c \in [2, 5]$  tal que  $f(c) = 1$ . Determine também o valor de  $f(c)$ .

10. Use o Teorema do valor intermediário para mostrar que  $f(x) = 3x^5 - 5x^4 - 3x - 1$  possui uma raiz real no intervalo  $[1, 2]$ . Idem para o intervalo  $[-1, -\frac{1}{2}]$ .

11. Mostre que o Teorema do valor intermediário garante que a equação  $x^3 + x + 3 = 0$  tenha uma raiz entre  $-2$  e  $-1$ .

12. (Sel. Mestr. UFSM 2013/1) Dizemos que uma função  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  é *côncava* se para quaisquer  $x, y \in I$  e  $t \in [0, 1]$ , temos

$$f(tx + (1-t)y) \geq tf(x) + (1-t)f(y).$$

Seja  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  côncava e contínua, com  $f(a) < f(b)$ . Mostre que para cada  $d \in (f(a), f(b))$ , existe um único  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = d$ .

13. (Sel. Mestr. UFSM 2012/1)

(a) Sejam  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  contínuas, com  $g(a) < f(a)$  e  $f(b) < g(b)$ . Mostre que existe  $c \in (a, b)$  tal que  $f(c) = g(c)$ .

(b) Sendo  $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm k\pi : k \in \mathbb{N}\}$ , através do item (a) mostre que a função  $h : D \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $h(x) = x - \cot(x)$  possui infinitas raízes.

14. (Sel. Mestr. UFSM 2015/1)

(a) Mostre que a função  $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , definida por

$$f(x) = \begin{cases} -2x^2 - 2x & \text{se } x \in [-1, -\frac{1}{2}] \\ |x| & \text{se } x \in (-\frac{1}{2}, 0] \\ x \operatorname{sen} \frac{1}{x} & \text{se } x \in (0, 1], \end{cases}$$

é contínua.

(b) A função dada no item anterior assume valor máximo no domínio de definição? Justifique.

15. (Sel. Mestr. UFSM 2011/1) Seja  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  uma função contínua que se anula nos racionais. Prove que  $f$  é identicamente nula.

16. Uma função  $f$  é dita ser *simetricamente contínua* em um ponto  $x$  se

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(x+h) - f(x-h)] = 0.$$

Mostre que se  $f$  é contínua em um ponto, então é simetricamente contínua no ponto, mas que a recíproca não é verdadeira.