

**Universidade Federal de Pelotas**  
**Disciplina de Cálculo 3 - Turma T4**  
**Prof. Dr. Maurício Zahn**  
**Lista 01 de Exercícios - Noções de Topologia**

1. Seja  $X$  o conjunto das funções contínuas em  $[0, 1]$  e seja  $\varphi : [0, 1] \rightarrow (0, +\infty)$  contínua. Defina

$$d(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| \cdot \varphi(x) dx.$$

Mostre que  $(X, d)$  é um espaço métrico.

2. Seja  $M = \mathbb{R}^2$ . Mostre que  $(M, d_1)$  e  $(M, d_\infty)$  são espaços métricos, onde, para  $x = (x_1, x_2)$  e  $y = (y_1, y_2)$ ,

$$d_1(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \quad \text{e} \quad d_\infty(x, y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}.$$

Em seguida, defina e desenhe as bolas abertas de centro em  $(0, 0)$  e raio unitário em  $(M, d_1)$  e  $(M, d_\infty)$ .

**Obs.** Nunca mais ria do Quico do episódio do Chaves quando ele queria uma “bola quadrada” - ele só estava lidando com outra métrica diferente da euclidiana...

3. Seja  $\mathbb{R}^+$  o conjunto dos números reais positivos. Mostre que

$$d(x, y) = \left| \frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right|$$

é uma métrica em  $\mathbb{R}^+$ .

4. Sejam  $(X_1, d_1)$  e  $(X_2, d_2)$  espaços métricos. Mostre que a aplicação  $d : X_1 \times X_2 \rightarrow [0, +\infty)$  definida por

$$d(x, y) = d_1(x_1, y_1) + d_2(x_2, y_2)$$

define uma métrica em  $X_1 \times X_2$ , onde  $x = (x_1, x_2)$  e  $y = (y_1, y_2)$ .

5. Mostre que uma sequência  $(x_n)$  converge para  $a$  em  $(X, d)$  se, e somente se, a sequência  $(d(a, x_n))$  converge para 0 em  $\mathbb{R}$  com a métrica usual.
6. Mostre que  $(x_n, y_n) \rightarrow (x, y)$  em  $\mathbb{R}^2$ , com a métrica usual se, e somente se,  $x_n \rightarrow x$  e  $y_n \rightarrow y$  em  $\mathbb{R}$  com a métrica usual.
7. Para quaisquer  $X, Y \subset \mathbb{R}$ , prove que
- (a)  $\text{int}(X \cap Y) = \text{int}(X) \cap \text{int}(Y)$ .
  - (b)  $\text{int}(X) \cup \text{int}(Y) \subset \text{int}(X \cup Y)$ .
8. Mostrar com um exemplo que, dados  $X, Y \subset \mathbb{R}$ ,  $\text{int}(X \cup Y) \neq \text{int}(X) \cup \text{int}(Y)$ .
9. Se  $A = [0, 1) \cup (1, 2] \cup \{3\}$ , determine  $\text{int}(A)$ .
10. Qual é o interior do conjunto  $\{(x, y) \in \mathbb{Q}^2 : x < y\}$  em relação a  $\mathbb{R}^2$ ? Justifique.
11. Mostre que o subconjunto  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x < y\}$  é um aberto de  $\mathbb{R}^2$ .
12. Mostre que o conjunto  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1, x > 0, y > 0\}$  é um aberto do  $\mathbb{R}^2$ .
13. Mostre que o conjunto  $\mathbb{N}$  dos números naturais é um fechado de  $\mathbb{R}$ .

14. Mostre que o conjunto  $\mathbb{Q}$  dos números racionais não é fechado e nem aberto de  $\mathbb{R}$ . Qual é o fecho de  $\mathbb{Q}$ ?
15. Faça o desenho de cada região do  $\mathbb{R}^2$  abaixo, identificando e justificando se a mesma é um aberto, ou fechado ou nem aberto e nem fechado do  $\mathbb{R}^2$ . Identifique o seu fecho e a sua fronteira. Decida também se algum deles é compacto do  $\mathbb{R}^2$ .
- (a)  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 < x^2 + y^2 \leq 9\}$
  - (b)  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d_1((x, y), (1, 0)) < 1\}$
  - (c)  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - xy < 1\}$
  - (d)  $X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : d_\infty((x, y), (0, 1)) \leq 1\}$