

**Universidade Federal de Pelotas**  
**Disciplina de Cálculo II**  
**Curso de Lic. em Matemática**  
**Prof. Dr. Maurício Zahn**  
**Lista 06 de Exercícios**  
 (integrais da forma  $R(\sin x, \cos x)$  e  $R(x^{\frac{1}{m}})$ ; integrais impróprias)

1. Calcule cada integral indefinida abaixo.

(a)  $\int \frac{dx}{2 + \cos x}$

(b)  $\int \frac{2 - \sin x}{2 + \cos x} dx$

(c)  $\int \frac{dx}{4 - 5 \sin x}$

(d)  $\int \frac{\cos x dx}{1 + \cos x}$

(e)  $\int \frac{dx}{2 + \sin x}$

(f)  $\int \frac{2 \tan x}{2 + 3 \cos x} dx$

(g)  $\int \frac{\sqrt{x^3} - \sqrt[3]{x}}{6 \sqrt[4]{x}} dx$

(h)  $\int \frac{\sqrt[7]{x} + \sqrt{x}}{\sqrt[7]{x^8} + \sqrt[14]{x^{15}}} dx$

(i)  $\int \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx$

(j)  $\int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt[4]{x^3} + 1}$

(k)  $\int \frac{\sqrt{x} dx}{x^3 + 2x^2 - 3x}$

(l)  $\int \frac{dx}{\sqrt{x} \sqrt[3]{x} (1 + \sqrt[3]{x})^2}$

(m)  $\int \frac{dx}{x - x^{\frac{4}{3}}}$

(n)  $\int \frac{dx}{(x-2)^{\frac{1}{2}} - (x-2)^{\frac{3}{4}}}$

2. Mostre que  $\int_0^1 \frac{x^{\frac{3}{2}} dx}{x+1} = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{3}$ .

3. Mostre que

$$\int_3^{29} \frac{(x-2)^{\frac{2}{3}} dx}{(x-2)^{\frac{2}{3}} + 3} = 8 + \frac{3}{2}\pi\sqrt{3}.$$

4. Leia atentamente a tira abaixo, adaptada de histórias em quadrinhos da DC Comics.



Mostre que você também tem superpoderes e junte-se à Liga da Justiça ajudando o Superman a resolver a integral indefinida dada. Uma Superforça para você é mudar de variável, por exemplo, tente escrevendo  $x + 1 = t^2$ .

5. Calcule cada integral definida a seguir, se existir

$$(a) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}}$$

$$(b) \int_{-1}^1 \frac{dx}{x^4}$$

$$(c) \int_0^{+\infty} e^{-x} dx$$

$$(d) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^3+1}$$

$$(e) \int_0^1 \ln x dx$$

$$(f) \int_{-\infty}^0 e^{4x} dx$$

$$(g) \int_0^{+\infty} \sin x dx$$

$$(h) \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2+1} dx$$

$$(i) \int_2^6 \frac{dx}{\sqrt[3]{(4-x)^2}}$$

6. Seja  $p$  uma constante positiva. Determine o valor de  $p$  para que a integral

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$$

seja convergente.

7. Calcule a integral  $\int_0^1 \ln x dx$ , se esta integral existir.

8. **A Função Gamma.** Definimos, para cada<sup>1</sup>  $n \in \mathbb{N}$ , a função

$$\Gamma(n) = \int_0^{+\infty} e^{-x} x^{n-1} dx$$

Tal função é chamada de *função Gamma*.

(a) Usando integração por partes e a regra de L'Hospital, mostre que

$$\Gamma(n) = (n-1)\Gamma(n-1).$$

(b) Mostre, em particular, que  $\Gamma(1) = 1$ . Conclua que  $\Gamma(n) = (n-1)!$ , onde “!” expressa o *fatorial* de  $n$ .

9. Calcule a integral imprópria  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2-6x+10}$ , se existir.

---

<sup>1</sup>De fato, esta função também fica bem definida se  $n$  for racional ou inteiro negativo. Assim, a função Gamma generaliza a noção de fatorial de um número inteiro para um número racional e para um número negativo!